

وقائع المؤتمر العلمي السنوي الثالث لقسم الجغرافيت / كلية التربية الاساسية
الجامعة المستنصرية وتحت شعار
(الجغرافيا ودورها في اغناء المعرفة العلمية والتربوية)
24-25 أيار 2021

تقانات الري الحديثة ودورها في التوسع الزراعي لإنتاج محصول القمح
(محافظة كربلاء المقدسة إنموذجا)

م.م. علاء عبد الاله فيصل

الجامعة المستنصرية
كلية التربية الاساسية

alaa_lover95@yahoo.com

07700600157

د. شهلة ذاكر توفيق

الجامعة المستنصرية
كلية التربية الاساسية

Shahla_thakir4@gamil.com

07700123879

مستخلص البحث:

تستند هذه الدراسة إلى معرفة أهم تقانات الري الحديثة المستخدمة في زراعة وإنتاج محصول القمح في محافظة كربلاء المقدسة ومعرفة مدى دورها في التوسع الزراعي لإنتاجه فضلا عن معرفة مدى توفيرها لكميات المياه المستخدمة إذا ما قورنت بطرائق الري التقليدية، والتي قد تبين من خلالها إن أهم تقانات الري الحديثة المستخدمة في إنتاج محصول القمح هي (الري بالرش الثابت والمحوري) وإن حجم الاستهلاك المائي للمناطق المستخدمة لتقانات الري الحديثة كان أقل من حجم الاستهلاك المائي لطرائق الري التقليدية بنسبة (67%)، وإنه لو استخدمنا طرائق الري الحديثة بدلاً عن طرائق الري التقليدية في منطقة الدراسة سنستطيع أن نوفر كميات من المياه لمساحة يبلغ قدرها (9846) دونم والسبب في ذلك يعود إلى كفاءة طرائق الري الحديثة التي يمكن من خلالها التحكم في كمية المياه المضافة التي يصعب التحكم فيها عند استخدام طرائق الري التقليدية، إضافة إلى ما تمتاز به من عدم وجود فاقد للماء عند نقله من المصدر إلى الحقل، لأنه يتم عن طريق الأنابيب، بينما ينقل الماء بطرائق الري التقليدية بوساطة القنوات المبطنة أو الترابية المفتوحة والتي بسببها في كلا الحالتين يتعرض الماء إلى التبخر والنضح، فضلاً عن كمية من المياه الممتصة من النباتات والحشائش التي تنمو في هذه القنوات. ونتيجة لما تمتاز به هذه التقانات الحديثة من كفاءة إروائية فإن ذلك ساعد على التوسع في زيادة المساحات المزروعة قمحا فيها، فبينما كانت المساحة المزروعة قمحا تقدر بـ (16370) دونم خلال الموسم الزراعي (2010-2011) والذي يعد الموسم الأول لاستخدام طرائق الري الحديثة (الري بالرش)، أصبحت تقدر بـ (66924) دونم خلال الموسم الزراعي (2018-2019) ونتيجة لذلك زادت كمية الإنتاج بشكل ملحوظ حيث إنها وصلت إلى (68713) طن بعد إذ كانت تبلغ (9586) طن خلال الموسم الزراعي (2010-2011).

المقدمة:

تعد مياه الري ووفرته وطرائق استخدامها من أهم العناصر اللازمة لتطوير القطاع الزراعي وازدهاره، إضافة إلى كونها تعد العامل الأكثر أهمية في تحديد نسب الإنتاج الزراعي لجميع المحاصيل الزراعية في عموم البلاد وبالخصوص محصول القمح، الذي يعد من أهم محاصيل الحبوب في العراق والذي يحتل المرتبة الأولى من حيث الأهمية فيه، خاصة وإن هذا المحصول يشكل المصدر الرئيس والأساس لغذاء الإنسان والحيوان، وبما إن معظم الأراضي العراقية ومنها أراضي

منطقة الدراسة تصنف مناخيا ضمن الأقاليم الجافة وشبه الجافة ، باستثناء المناطق الشمالية والشمالية الشرقية التي تصنف ضمن المناطق الرطبة وشبه الرطبة ، فإن الاعتماد على مياه الأمطار لتلبية متطلبات الاحتياجات المائية لجميع المحاصيل الزراعية ومنها محصول القمح يكاد يكون شبه مستحيل في معظم هذه الأراضي ولهذا فإن جل اعتماد سكان هذا المناطق صار يتركز على المتوفر من المياه السطحية بالدرجة الأولى، و المياه الجوفية بالدرجة الثانية ، وبهذا فإنه من الضروري الحفاظ على ما يتوفر من مياه في من هذه المناطق لتلبية المتطلبات الزراعية واستثمار بالشكل الأمثل والصحيح .

مشكلة البحث :-

تتمحور المشكلة الرئيسية في هذا البحث حول معرفة دور تقانات الري الحديثة في مدى التوسع الزراعي لإنتاج محصول القمح في محافظة كربلاء المقدسة. والتي من خلالها يمكن وضع عدة تساؤلات أهمها ما يأتي :-

1- ما هي أهم تقانات الري الحديثة المستخدمة في زراعة وإنتاج محصول القمح في محافظة كربلاء المقدسة ؟

2- هل يوفر استخدام تقانات الري الحديثة كميات من المياه يمكن استثمارها في زراعة مساحات جديدة بمحصول القمح إذا ما قورنت بطرائق الري التقليدية ؟

3- هل بالإمكان الاعتماد على التقانات الحديثة في ري محصول القمح وزيادة إنتاجه في محافظة كربلاء المقدسة ؟

فرضية البحث :-

تنص فرضية الدراسة على ما يأتي :-

1- تتمثل تقانات الري الحديثة المستخدمة في زراعة وإنتاج محصول القمح في محافظة كربلاء المقدسة بالري بالرش الثابت والمتحرك .

2- إن استخدام التقانات الحديثة في الري ستوفر لمستخدميها كميات من المياه تمكنهم من استثمارها في التوسع بزراعة المحصول وزيادة إنتاجه، وذلك يعود إلى كفاءة هذه التقانات التي يمكن من خلالها التحكم في كمية المياه المضافة والتي يصعب التحكم فيها عند استخدام طرائق الري التقليدية ، إضافة إلى ما تمتاز به من عدم وجود فاقد للماء عند نقله من المصدر إلى الحقل ، لأنه يتم عن طريق الأنابيب ، بينما ينقل الماء بطرائق الري التقليدية بوساطة القنوات المبطنة أو الترابية المفتوحة والتي بسببها في كلا الحالتين يتعرض الماء إلى التبخر والنضح، فضلاً عن كمية من المياه الممتصة من النباتات والحشائش التي تنمو في هذه القنوات .

3- يمكن الاعتماد على التقانات الحديثة في الري لإرواء محصول القمح وزيادة إنتاجه كونها طريقة اقتصادية وعلمية يستفاد النبات بواسطتها من كمية المياه الواصلة إليه بهذه الطريقة برغم من قلتها خاصة وأن جذوره اللبية لا تتعمق أكثر من (10) سم وبهذا تكون كمية المياه الواصلة مفيدة كما وإنها لا تسمح بغسل التربة وفقدانها للعناصر الغذائية وإبعادها لعمق يكون دون مستوى جذور النباتات وبالتالي لا يستطيع الاستفادة منه كما في طريقة الري التقليدية الأخرى .

وقائع المؤتمر العلمي السنوي الثالث لقسم الجغرافيتا / كلية التربية الاساسيتا
الجامعة المستنصرية وتحت شعار
(الجغرافيا ودورها في اغناء المعرفة العلمية والتربويتا)
24-25 أيار 2021


حدود منطقة الدراسة :-

تناولت هذه الدراسة محافظة كربلاء المقدسة التي تقع فلكيا بين دائرتي عرض (10° 32' - 51° 32') شمالا وبين خطي طول (12° 43' - 19° 44') شرقا على أطراف الحافة الشرقية لهضبة البادية الشمالية من الهضبة الغربية، غرب نهر الفرات، وبذلك فهي تمثل جزءاً من إقليم الفرات الأوسط بالعراق، الخريطة(1).

وتشترك المحافظة إدارياً مع ثلاث محافظات، أولها محافظة الأنبار التي تحدها من الشمال والشمال الغربي، و محافظة بابل من الشرق، و محافظة النجف الأشرف من الجنوب. وتبلغ مساحة المحافظة حالياً (5034) كم²، وبذلك فهي تمثل (1.14%) من مساحة العراق البالغة (438317) كم². أما الحدود الزمانية للدراسة فهي تشمل المدة الزمنية للمواسم الزراعية من (2009-2019) علماً إن الموسم الزراعي (2018-2019) يعتبر دراسة لواقع الحال زراعة القمح في منطقة الدراسة.

خريطة (1)

موقع محافظة كربلاء من العراق



المصدر: من عمل الباحثان بالاعتماد على الهيئة العامة للمساحة، قسم إنتاج الخرائط ، خريطة العراق الإدارية ، بمقياس رسم (1:1000000) ، 2019 .

وقائع المؤتمر العلمي السنوي الثالث لقسم الجغرافيت / كلية التربية الاساسية
الجامعة المستنصرية وتحت شعار
(الجغرافيا ودورها في اغناء المعرفة العلمية والتربوية)
24-25 ايار 2021

أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الدراسة في معرفة الكفاءة الإروائية لتقانات الري الحديثة المستخدمة لري محصول القمح في محافظة كربلاء المقدسة، ومعرفة مدى مساهمتها في تقليل كميات المياه المهدورة إذا ما قورنت بطرائق الري التقليدية الأخرى المستخدمة في زراعة المحصول فضلا عن مدى مساهمتها في التوسع بزراعة المحصول وزيادة إنتاجه، كونه يعد من أهم المحاصيل الاستراتيجية و المهمة في البلاد عموماً ومنطقة الدراسة خصوصاً ، وان توفره بالكميات المطلوبة بات يشكل ضرورة من الضروريات الملحة، بعد أن أصبحت إمكانية إنتاجه من العوامل المسببة للاستقرار الاقتصادي. كما إن تبين إنتاجه في عموم البلاد وخصوصاً في منطقة الدراسة يستوجب امتلاك قوة إنتاجية ودراسة لكل الظروف الطبيعية والبشرية التي تهدد زراعته.

مبررات الدراسة:

إن هذه الدراسة تحاول الكشف عن مدى زيادة إنتاج محصول القمح باستخدام تقانات الري الحديثة ومدى مساهمتها في تقليل الهدر المائي الناتج عن استخدام طرائق الري التقليدية في زراعة محصول القمح .

منهجية الدراسة:

اتبع الباحثان في دراسة هذا الموضوع المنهج الوصفي والتحليلي ، مستمدين معلوماته وبياناته من الإحصاءات الرسمية الخاصة بمنطقة الدراسة ، فيما يتعلق ببيانات المساحات التي تشغلها زراعة القمح وإنتاجها وإنتاجيتها وطرائق الري المتبعة فيها فقد استمدت من مديرية زراعة في محافظة كربلاء المقدسة ، وما يتعلق بمعلومات المياه وكميات التصريف المائية ومناسبتها فقد استمدت من مديرية الموارد المائية في محافظة كربلاء المقدسة ، فضلا على ذلك فقد أعتد الباحثين على استمارة الإستبيان التي كان الهدف منها هو معرفة واقع حال زراعة القمح في ظل استخدام طرائق الري المختلفة والعوامل المؤثرة على استخدامها منطقة الدراسة وقد استخدمت تقنيات كمية في معالجة هذه البيانات و تصنيفها وتمثيلها على الخرائط الكمية.

أولاً: تقانات الري الحديثة:

تعد تقانات الري الحديثة من الأساليب والوسائل المستنبطة والحديثة في الإرواء الزراعي ، بهدف استغلال الموارد المائية المتاحة الاستغلال الأمثل ، بما ينعكس إيجابيا على استغلال أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاجية والإنتاج الزراعي . وتتمثل تقانات الري الحديثة المستخدمة في زراعة محصول القمح في محافظة كربلاء المقدسة بما يأتي:

1- الري بالرش (Sprinkler irrigation):

يعرف الري بالرش بأنه طريقة الري التي يتم فيها إضافة المياه إلى الحقل أو النباتات على هيئة رذاذ أو قطرات ماء شبيهة بقطرات المطر ، ولذا يعتبر الري بالرش هو نظام محاكاة الري للمطر مع القدرة في التحكم في وقته وكمية الماء المضاف ، ويتكون هذا الرذاذ نتيجة لمرور المياه تحت الضغط من

وقائع المؤتمر العلمي السنوي الثالث لقسم الجغرافيتا / كلية التربية الاساسيتا
الجامعة المستنصرية وتحت شعار
(الجغرافيا ودورها في اغناء المعرفة العلمية والتربويتا)
24-25 آيار 2021

خلال فتحات أو فوهات صغيرة مختلفة الأحجام من الرشاشات , ويتراوح ضغوط تشغيل الرشاشات من (2-5) بار , وتصريفاتها من (5-60) لتر/ثا⁽¹⁾, صور (1) و (2).

صورة (1) منظومة رش محورية في الجانب الصحراوي من ناحية الحر
صورة (2) منظومة رش ثابتة في أحد الحقول الزراعية في قضاء عين التمر



التقطت الصورة بتاريخ 2020/2/20 . التقطت الصورة بتاريخ 2020/2/18 .

ومن خلال الجدول (1) نلاحظ أكثر المساحات المستخدمة لطريقة الري بالرش تظهر في قضاء عين التمر الذي تقدر مساحته المزروعة فيه بنحو (40410) دونم وهذا ما يؤلف نسبته (77.5%) من مجموع المساحة الكلية المستخدمة لهذه الطريقة والتي تقدر بـ (52150) دونم , ثم يليه كل من ناحية الحر وقضاء كربلاء بمساحة تقدر بحوالي (8968 , 2772) دونم وهذا ما يؤلف نسبته (17.2% , 5.3%) لكل منهما على التوالي . الخريطة (2).

جدول (1)

الوحدات الإدارية المستخدمة لتقانات الري بالرش في محافظة كربلاء المقدسة لعام (2019)


| النسبة المئوية | المساحة المزروعة (دونم) | الوحدات الإدارية | طريقة الري |
|----------------|-------------------------|------------------|------------|
| 5.3 | 2772 | قضاء كربلاء | الري بالرش |
| 17.2 | 8968 | ناحية الحر | |
| 77.5 | 40410 | قضاء عين التمر | |
| 100 | 52150 | المجموع | |

المصدر : من عمل الباحثان بالاعتماد على مديرية زراعة محافظة كربلاء, قسم التخطيط والمتابعة, بيانات غير منشورة, 2019 .

¹ - الغباري , حسين بن محمد , إدارة وتنمية موارد المياه والري , دار جامعة الملك سعود , الرياض , 2013, ص503 .

خريطة (2)

التوزيع الجغرافي لتقانات الري بالررش المستخدمة في محافظة كربلاء المقدسة لعام (2019)



المصدر : من عمل الباحثان بالاعتماد على بيانات الجدول (1).

أ- محاسن نظام الري بالررش :-

يمتاز الري بالررش بمجموعة من المميزات التي فضلته على بقية طرائق الري الأخرى المستخدمة لإنتاج القمح في منطقة الدراسة أهمها ما يلي (1).

1-ري الأراضي ذات النفاذية العالية .
2-ري الأراضي ذات التضاريس الوعرة دون الحاجة إلى إجراء عملية التسوية كما في الري السطحي.

3-ري الترب ذات القوام المختلف بنفس الحقل طالما كان معدل إعطاء أقل من معدل التسريب الأدنى لهذه الترب .

4-ري الأراضي الضحلة القطاع دون الحاجة إلى الحد من خصوبتها في حالة إزالة الطبقات السطحية منها عند التسوية .

5-تتطلب معظم نظم الري بالررش القليل جداً من العمالة وذلك لأنها سهلة الإدارة و تعمل بالتشغيل الميكانيكي والآلي .

6-يمكن من خلالها التحكم في كميات المياه المضافة لسد الاحتياجات المائية للنباتات دون العمل على رفع مستوى المياه الجوفية , وهذا ما لا يمكن تحقيقه في الري السطحي .

¹ - كيلر ، جاك ، رون بليجرز ، الري بالررش والري بالتنقيط ، ترجمة عبد الرحمن بن علي العذبة ، دار جامعة الملك سعود ، الرياض ، 2014، ص19.

وقائع المؤتمر العلمي السنوي الثالث لقسم الجغرافية / كلية التربية الاساسية
الجامعة المستنصرية وتحت شعار
(الجغرافيا ودورها في اغناء المعرفة العلمية والتربوية)
24-25 أيار 2021

- 7- تحقيق نسبة عالية من الإنبات وانتظام موعد نضج المحصول , وذلك نتيجة لإعطاء رية خفيفة بالرش عقب زراعة البذور مع تجانس توزيع الرطوبة .
- 8- يستخدم الرش كوسيلة لتوزيع الأسمدة والمخصبات والحماية من الصقيع.
- 9- الحد من الانجراف السطحي للتربة .
- 10- إمكانية استغلال الكميات المائية الصغيرة بكفاءة عالية.
- 11- تقليص ضائعات المياه بشكل كبير إذا ما قورنت بطرائق الري السطحي التقليدية, حيث تصل كفاءة نقل المياه بطريقة الري بالرش إلى 100% بسبب نقلها بواسطة الأنابيب . في حين تصل ضائعات نقل المياه بطرائق الري السطحي إلى أكثر من 40% , لان نقله عادة ما يتم من خلال قنوات مفتوحة قد تكون ترابية أو مبطنة وفي كلتا الحالتين يحدث فقد الماء إما بالتبخر والنضح من جدران القنوات أو الطفح من أكتافها خلال نقله من المصدر إلى الحقل , ويضاف إلى هذه المفقودات ما تمتصه النباتات التي تنمو في هذه القنوات كالحلفاء والقصب والطحالب وما تسببه من مشاكل في إعاقة حركة المياه والكلفة الإضافية اللازمة لمكافحة هذه النباتات وتنظيف القنوات⁽¹⁾ .

ب- مساوي الري بالرش :-

- 1- إن التكاليف الأولية وتكاليف الضخ الخاصة بنظم الري بالرش تكون أعلى من التكاليف الخاصة بنظم الري السطحي .
- 2- عطل أي مضخة بسبب انقطاعا كليا للمياه عن الحقل .
- 3- الحاجة إلى كادر فني ذو خبرة كبيرة في مجال تشغيل الآلات والمعدات وصيانتها⁽²⁾ .
- 4- صعوبة استخدام هذه الطريقة في الري عندما تكون الرياح عالية والرطوبة منخفضة . لان ذلك يؤدي إلى زيادة الضائعات المائية بالتبخر وانخفاض كفاءة الري . كما إن الرياح العالية تؤدي إلى عدم تجانس توزيع الماء على سطح التربة الأمر الذي ينعكس سلبا على المحتوى الرطوبي داخل التربة , وعلى نمو النباتات . لذلك يجب اختيار الوقت المناسب للتشغيل⁽³⁾ .
- 5- لا تساعد هذه الطريقة من الري على إزالة ملوحة التربة نظرا للكمية القليلة من المياه التي يمنحها , وبالتالي لا بد عند استخدامه مع الأراضي ذات الملوحة المرتفعة نسبيا من حساب دقيق لكميات المياه التي يعطيها .

¹ - الحديثي, عصام خضير, وآخرون , تقانات الري الحديثة , ط1 , كلية الزراعة, جامعة الأنبار , 2010, ص95.

² - خلف , قيس ياسين , استخدام التقنيات الحديثة في الاستثمار الأمثل لموارد المياه السطحية وأثرها في زيادة المساحات المزروعة في محافظة ديالى , رسالة دكتوراه (غير منشورة) , مقدمة لقسم الجغرافيا , كلية التربية , الجامعة. ديالى 2014, ص172.

³ - استمارة الاستبيان 2019.

وقائع المؤتمر العلمي السنوي الثالث لقسم الجغرافيت / كلية التربية الاساسيت
الجامعة المستنصرية وتحت شعار
(الجغرافيا ودورها في اغناء المعرفة العلمية والتربويت)
24-25 أيار 2021

6- تؤدي إلى انتشار الأمراض ما بين أوراق المحصول بسبب قوة التصادم التي ترتطم بها قطرات النباتات بالأوراق المصابة والتي تؤدي إلى ارتدادها وانتقالها إلى أوراق أخرى سليمة , وهذا ما يسبب انتقال الأمراض .

ثانيا :- تصنيف طرائق الري بالرش:

إن التطور السريع في أصناف نظم الري بالرش خلال العقود الخمسة السابقة بسبب تطور البحث العلمي من ناحية ورغبة الشركات المصنعة لتحسين إنتاجها وطرح أجيال حديثة من هذه النظم في الأسواق تساهم في معالجة العيوب والمشاكل التي تظهر عند التشغيل الحقل في الأجيال السابقة , قد أدى إلى ظهور عدة تصانيف ومسميات لنظم الري بالرش , وإن أفضل هذه التصانيف وأشهرها هو التصنيف الذي يعتمد على حالة رأس المرشة أثناء اشتغال نظام الري كونه ثابتاً في موقعه أم متحركاً , وعلى أساس ذلك فإن نظم الري تصنف إلى صنفين أساسيين هما :-

1- نظم الري بالرش الثابتة:

وفيه يكون رأس المرشة ثابتاً في موقعه أثناء التشغيل . وتصنف تبعاً لمدى كفاية أنابيب الشبكة (رئيسية أو فرعية أو أنابيب رش) لتغطية مساحة الحقل إلى (1) .

أ- نظام الشبكة الكاملة:

وفيه يكون أعداد جميع أنواع الأنابيب كافية لتغطية عموم مساحة الحقل , وهي مدفونة تحت سطح التربة , أو ظاهرة على السطح عندما يراد مناقلتها من حقل إلى آخر بعد إكمال الموسم . صورة (3).

ب- نظام الشبكة المنقولة:

وفيه يكون أعداد الأنابيب (ربما الرئيسية أو الفرعية أو أنابيب الرش) غير كافية لتغطية عموم مساحة الحقل فيصار إلى نقل الأنابيب من موقع إلى آخر ضمن الحقل الواحد خلال الري الواحدة . ويتم نقل الأنابيب إما يدوياً فتسمى النظم المنقولة باليد ومنها نظم الري بالرش المسمى خطأً من قبل المزارعين بـ (الثابت) تميزاً له عن نظام الري المحوري لأنه في الحقيقة من أنظمة الري بالرش نصف الثابتة أو نصف المنقولة , إذ إن خط الأنابيب الرئيسية وطاقة الضخ ثابتين خلال الموسم ويتم مناقلة الخطوط الأنابيب الفرعية ضمن الحقل الواحد خلال الري الواحدة بسبب عدم كفايتها لتغطية مساحة الحقل بالكامل . صورة (4) .

¹ - الحديثي, عصام خضير, وآخرون , تقانات الري الحديثة , ط1 , كلية الزراعة, جامعة الأنبار , 2010, ص99.

وقائع المؤتمر العلمي السنوي الثالث لقسم الجغرافيت / كلييت التربييت الاساسييت
الجامعت المستنصرييت وتحت شعار
(الجغرافيا ودورها في اغناء المعرفة العلمية والتربييت)
24-25 آيار 2021

صورة (4)

مرشة ثابتة بالنظام المنقول في قضاء عين التمر



التقطت الصورة بتاريخ 2020/2/18 . التقطت الصورة بتاريخ 2020/2/18 .

2- نظام الري بالرش دائم الحركة :-

وفيه يكون رأس المرشة متحركاً باستمرار أثناء عملية ري الحقل , وأشهر هذه النظم هو نظام الري بالرش المحوري ونظام الري بالرش الخطي ونظام الري بالرش السيار ومن أنواعه النظام المدفعي . وإن ما يهمننا من هذه النظم هو نظام الري بالرش المحوري كونه النظام المعتمد في منطقة الدراسة:-

أ- الري بالرش المحوري :-

وهو من نظم الري بالرش دائم الحركة , أي إن الرشاش يكون فيه متحركاً باستمرار أثناء عملية الري . وقد تم اختراعه عام 1952 , ويستخدم على نطاق واسع في زراعة الصحراء نظراً لوجود مساحات واسعة خالية من العوارض فضلاً إلى أن الجهاز يكون اقتصادياً في مثل هذه المساحات , ويعد الري بالرش المحوري أقل تكلفة من نظم الري بالرش النصف الثابتة , ولكي يكون الجهاز المحوري اقتصادياً يجب أن لا يقل طوله عن (400) م , حيث يروي مساحة (50) دونم دائرية . وتتناسب تكلفة الجهاز مع نصف قطر دائرة الري بينما تتناسب المساحة المروية مع ربع نصف قطره⁽¹⁾ . يعد نظام الري المحوري في الوقت الحاضر جهاز ذو مستوى عالي من التقنية ومعول عليه في تغيير الوجه الزراعي وخصوصاً في المناطق ذات المناخ الحار , بسبب إمكانيته المتعددة والواسعة في ري الأراضي ذات الأشكال غير المنتظمة والمتموجة , وقدرته الكبيرة على توزيع الماء والكيماويات (المبيدات والأسمدة) بشكل متجانس . وقد أطلق هذا الاسم على الجهاز بسبب حركته الدائرية حول نقطة مركزية تسمى المحور . وبعد ما تقدم فأن مجموع المستخدم منها في منطقة الدراسة بلغ نحو (598) منظومة . (198) منها تم تجهيزها للمزارعين وبسعر مدعوم من قبل الدولة ضمن مشروع استخدام تقانات الري الحديثة , وبواقع (150) منظومة محورية مختلفة الأحجام , و(48) منظومة ري متناقلة سعة (42) دونم . جدول (2).

¹ - المصدر نفسه , ص 131.

وقائع المؤتمر العلمي السنوي الثالث لقسم الجغرافيتا / كلية التربية الاساسيتا
الجامعة المستنصرية وتحت شعار
(الجغرافيا ودورها في اغناء المعرفة العلمية والتربويتا)
24-25 آيار 2021

جدول (2)

منظومات الري بالرش في محافظة كربلاء المقدسة المدعومة ضمن مشروع استخدام تقانات الري الحديثة لعام (2019)

| النسبة المئوية | العدد | نوع المنظومة وحجمها |
|----------------|-------|-------------------------------|
| 15.2 | 30 | منظومة رش محورية 120 دونم |
| 27.8 | 55 | منظومة رش محورية 80 دونم |
| 14.1 | 28 | منظومة رش محورية 68 دونم |
| 18.7 | 37 | منظومة رش محورية 60 دونم |
| 24.2 | 48 | منظومة رش متناقلة سعة 48 دونم |
| 100 | 198 | المجموع |

المصدر :

1- مديرية زراعة محافظة كربلاء , قسم التخطيط والمتابعة , بيانات غير منشورة , 2019 .

2- استمارة الإستيبيان , 2019 .

وأما المنظومات الباقية والتي يقدر عددها بـ (400) منظومة فقد حصل عليها المزارعون من الأسواق المحلية. وقد تبين من خلال الدراسة الميدانية التي أجراها الباحثان أن أغلب المزارعين الذين يحصلون على منظوماتهم من الأسواق المحلية لا يستخدمون منظومات الري بالرش المتناقلة كونها تحتاج إلى الجهد والوقت عند نقلها من مكان إلى آخر فضلا عن تكاليفها المرتفعة نسبيا مقارنة بالمساحة التي تغطيها.

وإضافة إلى المنظومات أعلاه يوجد تخصيص (38) منظومة رش محورية بحجم (60) دونم سوف يتم تجهيزها حاليا للمزارعين من قبل المديرية . و(38) منظومة رش محورية بحجم (120) دونم ولكنها لم ترد إلى المخازن لحد الآن⁽¹⁾.

محاسن نظام الري بالرش المحوري :-

لهذا النوع من أنظمة الري بالرش عدد من المزايا الخاصة فضلا عن المزايا العامة التي ذكرت فيما سبق . وأهم هذه المزايا هي :-

1- يكفي عامل واحد لتشغيل نظام الري المحوري . وهذا يعد من المزايا الأساسية التي يتميز بها هذا النظام عن نظام الري نصف الثابت وخصوصا في المزارع التي تقل فيها الأيدي العاملة أو عندما تكون الأيدي العاملة ذات كلفة مرتفعة نسبيا .

2- يستلم الجهاز الماء عبر نقطة واحدة وثابتة تمثل مركز الحقل و مما يسهل عملية نقل الماء إلى هذه النقطة .

¹ - مقابلة شخصية مع المهندس الزراعي أحمد نعمه عبد الأمير ، رئيس فريق الهيئة الزراعية في مديرية الزراعة بمحافظة كربلاء المقدسة ، 2019/12/14 م.

وقائع المؤتمر العلمي السنوي الثالث لقسم الجغرافيتا / كلية التربية الاساسيتا
الجامعة المستنصرية وتحت شعار
(الجغرافيا ودورها في اغناء المعرفة العلمية والتربويتا)
24-25 أيار 2021

- 3- يتم التحكم في تشغيل الجهاز عن نقطة واحدة وثابتة وهي مركز الحقل . وهذا ما يسهل عملية التشغيل ويقلل الحركة داخل الحقل .
- 4- سهولة إضافة الأسمدة والمبيدات من خلال عدة التسميد الملحقة مع الجهاز .
- 5- إمكانية الحصول على كفاءة توزيع وتجانس مياه عالية . إذ إن تأثير الرياح اقل مقارنة بنظم الري نصف الثابتة .
- 6- المرونة في تحديث النظام المحصولي . حيث نتيجة الموثوقية والدقة التي يتمتع بها النظام , أصبح المستخدم قادر على زراعة المحاصيل ذات المردود المالي , كما يؤدي تحسين برامج الإدارة واستخدام الجهاز للتسميد إلى زيادة العوائد .
- 7- يعطي الجهاز للمستخدم المرونة في وقت وكمية إضافة الماء . وإن التحكم في كمية ووقت الإضافة يمكن المزارع من زراعة أكثر من محصول في الحقل , فمثلا يزرع نصف الحقل قطن ويزرع النصف الآخر بمحصول تكون احتياجاته المائية أقل مثل القمح وعند مرور الجهاز على الحقل فإنه يبرمج بحيث يعطي كمية قليلة من الماء إلى محصول القمح وكمية أكبر من الماء إلى محصول القطن.

مساوئ نظام الري بالرش المحوري :-

- 1- المساحة المروية تكون بشكل دائري مما يؤدي إلى ضياع جزء من أراضي الحقول ذات الشكل المستطيل أو المربع , ويمثل هذا الجزء الزوايا الأربع للحقل. ولكن في التصاميم الحديثة لهذا النوع من المنظومات أمكن معالجة هذا العيب من خلال ربط ذراع إضافي يربط بزوايا معينة مع الذراع الأخير للجهاز يقوم بري زوايا الحقل التي لا تصلها المياه من الجهاز الأصلي .
- 2- يحتاج إلى مهارة في التشغيل والإدارة والصيانة أكثر نسبيا مقارنة بنظم الري بالرش نصف الثابتة⁽¹⁾.

ثالثاً :- المشاكل التي تواجه استخدام تقانات الري بالرش في منطقة الدراسة :-

من خلال الدراسة الميدانية واستمارة الاستبيان التي أعدها الباحثان تبين إن المشاكل التي تواجه استخدام طرائق الري الحديثة في محافظة كربلاء تتمحور في ما يلي⁽²⁾:-

1- مشكلة الدعم الحكومي :-

تتمثل مشكلة الدعم الحكومي في عدم توفير القروض للمزارعين لغرض شراء هذه المنظومات الحديثة أو تجهيزها لهم بالكميات التي تغطي احتياجات المزارعين وحقولهم الزراعية.

2- مشكلة الوقود :-

غالبا ما تبرز هذه المشكلة في الأعوام التي تعاني فيها منطقة الدراسة من قلة كمية الأمطار الساقطة وانخفاضها إلى مستويات متدنية نسبيا حيث إن كمية الوقود المجهزة للمزارعين من قبل الدولة تكون غير كافية إذا ما قورنت بعدد الساعات التشغيلية للمنظمات ، فلذلك يضطر المزارعون إلى شراء

¹- الحديثي, عصام خضير, وآخرون , تقانات الري الحديثة , ط1 , كلية الزراعة, جامعة الأنبار , 2010, ص144.

²- دراسة ميدانية , 2019.

وقائع المؤتمر العلمي السنوي الثالث لقسم الجغرافيتا / كلية التربية الاساسيتا
الجامعة المستنصرية وتحت شعار
(الجغرافيا ودورها في اغناء المعرفة العلمية والتربويتا)
24-25 آيار 2021

كميات إضافية من الوقود لسد النقص الحاصل لديهم وهذا بالتالي سوف يثقل كاهل المزارع ويزيد من تكاليف العملية الإنتاجية .

3- مشكلة الصيانة :-

تعد مشكلة صيانة منظومات الري بالرش في حالة توقفها عن العمل من أهم المشاكل التي يعانيها المزارعون المستخدمون لطرائق الري الحديثة في منطقة الدراسة و أخطرها . خاصة في الحالات التي يصعب على المزارع وعلى الرغم من خبرته المتراكمة صيانتها , لأن ذلك سوف يعرض محصوله للهلاك في حالة استمرار توقف عمل منظومة الري بالرش لمدة أطول , بسبب ما تعانيه منطقة الدراسة من قلة عدد العاملين في صيانتها , فلذلك يضطر المزارعون للاستعانة بعمال صيانه من محافظات أخرى لمعالجة بعض المشاكل التي تواجههم في حال توقف منظمة الري بالرش عن العمل .

رابعاً :- نوعية المياه الملائمة للري بالرش :-

تعد نوعية المياه من أهم العوامل المحددة لمدى صلاحيتها للري والتي يختلف تأثيرها على التربة ونمو النباتات من طريقة ري لأخرى بحسب كمية الأملاح الموجودة فيها ودرجة نفاذية التربة ومدى مقاومة النبات للأملاح وقد حددت منظمة الأغذية والزراعة الدولية (FAO) مديات لمعايير المياه المستخدمة في الري والتي كانت نسبة المحدد منها للري بالرش هو أقل من بقية الطرائق الأخرى , لان كميات المياه المستعملة فيها تكون قليلة إذا ما قورنت بنظام الري السطحي , وإن المياه الخارجة من المرشاة تسقط على الجزء الخضري للنباتات مباشرة وهو ما يزيد من خطورة استعمال المياه المالحة على النباتات بسبب امتصاص الجزء الخضري منها للأملاح . جدول (3).

جدول (3)

دليل FAO في تقييم مياه الري

| دليل نوعية المياه | | | طريقة الري | الصفة |
|-------------------|---------------|------------|-------------|--------------------|
| حدوث مشكلة | زيادة المشكلة | بدون مشكلة | | |
| 3 < | 3 - 0.7 | 0.7 > | جميع الطرق | EC دسي سيمنز/م |
| 9 < | 9 - 3 | 3 > | الري السطحي | Na ملي مكافئ /لتر |
| ----- | 3 < | 3 > | الري بالرش | |
| 10 < | 10 - 4 | 4 > | الري السطحي | CL ملي مكافئ /لتر |
| ----- | 3 < | 3 > | الري بالرش | |
| 2 < | 2 - 0.7 | 0.7 > | جميع الطرق | B ملي مكافئ /لتر |
| 8.5 < | 8.5 - 1.5 | 1.5 > | جميع الطرق | HCO3 ملي مكافئ لتر |

المصدر : عصام خضير الحديثي , وآخرون , تقانات الري الحديثة , مصدر سابق , ص 49 .
وتختلف هذه المعايير عند استخدام مياه الري لري المحاصيل الشتوية كالفحم والشعير عما هو عليه عند استخدامها لري المحاصيل الصيفية . وفي العراق استخدمت مياه ذات ملوحة تصل إلى (4.5 دسي سيمنز /م) لري المحاصيل الشتوية . وذات ملوحة تصل إلى (3.0

وقائع المؤتمر العلمي السنوي الثالث لقسم الجغرافيتا / كلية التربية الاساسيتا
الجامعة المستنصرية وتحت شعار
(الجغرافيا ودورها في اغناء المعرفة العلمية والتربويتا)
24-25 آيار 2021

دسي سيمنز/م) , لري المحاصيل الصيفية كز هرة الشمس والذرة الصفراء وكانت الإنتاجية أعلى من إنتاجية المحاصيل التي تروى بطريقة ري الألواح الشريطية على الرغم من حصول اختزال في الإنتاجية عند مقارنتها بإنتاجية المحاصيل التي تروى بطريقة الري بالرش وذات ملوحة مياه أقل من (3 دسي سيمنز/م). وعلى العموم وتحت أي طريقة إرواء كانت فإن تركيز الأملاح في مياه الري ليست هي العامل الوحيد في تحديد صلاحية المياه للري , فإن طبيعة النباتات وتحملها للملوحة تتغير بدرجة كبيرة من نبات إلى آخر وهذا ملاحظة في الجدول (4) الذي يعطينا دليلا واضحا لمقاومة بعض النباتات للأملاح .

جدول (4)

معايير مقاومة بعض النباتات للأملاح

| مقاومة عالية للملوحة 12 - 8 دسي سيمنز/م | عالية المقاومة نسبيًا للملوحة 8 - 6 دسي سيمنز/م | متوسطة المقاومة للملوحة 6 - 4 دسي سيمنز/م | حساسة للملوحة 4 - 2 دسي سيمنز/م |
|---|---|---|--|
| محاصيل الخضر | | | |
| الاسبركس | البنجر , الكرنب , السبانغ الباميا | الطماطة , القرنابيط , الفلفل اللهاثة , البصل , الخس الذرة الحلوة , الرقي , البطيخ | اللوبيبا , الفاصوليا الكرفس , الفجل |
| محاصيل الفاكهة | | | |
| النخيل | الرمان , التين | الزيتون , العنب | الكمثري , الخوخ التفاح , البرتقال الليمون , المشمش |
| المحاصيل الحقلية | | | |
| الشعير البنجر السكري | القطن , الشيلم , الحنطة الشوفان , الرز | فول الصويا الذرة الصفراء والبيضاء | اليزاليا الفاصوليا الخضراء |
| المحاصيل العلفية | | | |
| حشيش برمود شعير العلف | الحشائش , أنجت الحنطة العلفية | الدخن | البرسيم بكافة أنواعه |

المصدر : عصام خضير الحديثي , وآخرون , تقانات الري الحديثة , مصدر سابق , ص 50 .
إن نوعية المياه وملوحتها لا ترتبط بمدى الضرر الذي تسببه للنباتات فحسب بل هنالك وجة آخر للمشكلة يتعلق بالضرر الذي يسببه استخدام المياه المالحة على منظومات الري بالرش , والذي يطلب أيضا تقيما لنوعية المياه المستخدمة في الري من حيث التركيب الكلي للأملاح الذائبة وتركيز بعض العناصر التي من الممكن أن تتفاعل مع المواد المصنعة للمنظومات فتسبب تلفها واندثارها مما يقلل في عمرها الإنتاجي. فعلى سبيل المثال وجد إن استخدام مياه بعض الآبار والعيون الحاوية على تركيز عالٍ من الكبريت في منظومة الري بالرش المصنعة من الألمنيوم يؤدي إلى تآكل الأنابيب وحصول ثقوب فيها وكذلك الأجزاء الأخرى للمنظومة . ولذا ينصح لمثل هذه الحالات استخدام منظومة الري المصنعة من البولي أنيلين , كم وإن الاتجاه الحديث لتصنيع منظومات الري بالرش الثابتة هو استخدام مادة البولي أنيلين (P.E) أو مادة البولي فينايل (PVC) بدلا من الحديد المغلون أو الألمنيوم وذلك للحد من مشكلة الري المرتبطة بنوعية المياه . وأما نظم الري بالرش المتحركة كالنظام المحوري فقد

وقائع المؤتمر العلمي السنوي الثالث لقسم الجغرافيت / كلية التربية الاساسية
الجامعة المستنصرية وتحت شعار
(الجغرافيا ودورها في اغناء المعرفة العلمية والتربوية)
24-25 آيار 2021

استخدمت تقانة متطورة لتصنيعه تضمن إكساء جميع أنابيب نقل الماء في المنظومة بطبقة من البولي أثيلين وتسمى مثل هذه الأنابيب المصنعة من الحديد المغلون والمبطننة من الداخل بالبولي أثيلين (Perma-pipe) وهذه التقانة يمكنها إطالة عمر استخدام المنظومة إلى الضعف حتى لو كانت المياه المستخدمة في الري ذات ملوحة عالية . ولكم من عيوب هذه التقانة هو تسريب الماء بين طبقة الحديد وطبقة التبتين الأمر الذي تصبح فيه طبقة التبتين بدون جدوى . وبناء على محددات نوعية المياه الملانمة لمدى مقاومة النباتات للأملاح ولمدى استخدامها في منظومات الري بالررش الحديثة اعتمد الباحثان على مجموعة نتائج مختبرية من العينات المأخوذة التي قام الباحثان بتحليلها والتي بلغ عددها (12) نتيجة مختبرية تم فحصها من قبل قسم التربة والمياه في مديرية زراعة محافظة كربلاء المقدسة قبل بداية الموسم الزراعي (2018-2019) لأبار مجموعة من المزارعين في كل من قضائي كربلاء وعين . جدول (5) وكانت أعماق الأبار مختلفة ما بين (50-190) م , ودرجة الحرارة عند التدفق ما بين (21.8 - 28.5) ودرجة تفاعل الـ ph تتراوح ما بين (7.1-8.4) , وكان التوصيل الكهربائي EC الذي يمثل كمية الأملاح التي تحتويها المياه يتراوح ما بين (2.1-4.1) دسي سيمنز/م . ومن خلال مقارنة نتائج فحوصات عينات المياه التي وردت في الجدول (5) والمعايير التي حددتها منظمة الأغذية والزراعة الدولية (FAO) تبين لنا أن معظم المياه المستخدمة للري في كل من قضاء كربلاء وناحية الحر هي مطابقة للمعايير العالمية ولا يؤدي استثمارها إلى حدوث أي مشاكل تذكر سواء على محصول القمح أو منظومات الري بالررش, وأما النتائج المختبرية لقضاء كربلاء فإنها تشير إلى إن نسبة الملوحة المرتفعة نسبيا قد تسبب بعض الأضرار لمنظومات الري بالررش وخاصة المصنعة من الألمنيوم حيث تؤدي إلى تآكل الأنابيب وحصول ثقب فيها .

جدول (5)

نتائج الفحوصات المختبرية لمياه الأبار لعام (2019)

| ت | مكان البئر | احداثيات البئر | | عمق البئر | درجة التفاعل الـ ph | التوصيل الكهربائي |
|----|----------------|----------------|-------------|-----------|---------------------|-------------------|
| | | E | N | | | |
| 1 | قضاء كربلاء | 32°27'28.11 | 44°06'59.09 | 50 | 8.42 | 4.1 |
| 2 | قضاء كربلاء | 32°24'38.82 | 44°07'26.85 | 67 | 8.2 | 3.9 |
| 3 | قضاء كربلاء | 32°20'27.82 | 44°07'42.93 | 75 | 8 | 3.8 |
| 4 | قضاء كربلاء | 32°19'49.35 | 44°12'43.07 | 100 | 7.8 | 3.6 |
| 5 | ناحية الحر | 32°29'56.00 | 43°55'02.22 | 200 | 7.5 | 2.8 |
| 6 | ناحية الحر | 32°29'23.88 | 43°52'16.96 | 250 | 7.2 | 2.5 |
| 7 | ناحية الحر | 32°26'46.42 | 43°55'59.74 | 256 | 7.4 | 2.4 |
| 8 | ناحية الحر | 32°27'57.03 | 43°52'11.86 | 280 | 7.1 | 2.1 |
| 9 | قضاء عين التمر | 32°25'52.21 | 43°33'54.56 | 80 | 7.3 | 3.1 |
| 10 | قضاء عين التمر | 32°28'35.16 | 43°36'45.11 | 100 | 7.2 | 3.02 |
| 11 | قضاء عين التمر | 32°30'28.43 | 43°34'26.38 | 120 | 7.2 | 2.9 |
| 12 | قضاء عين التمر | 32°30'03.06 | 43°30'28.13 | 130 | 7.14 | 2.4 |

وقائع المؤتمر العلمي السنوي الثالث لقسم الجغرافيتا / كلية التربية الاساسيتا
الجامعة المستنصرية وتحت شعار
(الجغرافيا ودورها في اغناء المعرفة العلمية والتربويتا)
24-25 آيار 2021

المصدر : من عمل الباحثان بالاعتماد على تحليل عينات أخذت من مياه الآبار في محافظة كربلاء المقدسة , 2019 .

وإضافة لما تقدم من تقانات الري الحديثة المستخدمة في زراعة محصول القمح في محافظة كربلاء المقدسة توجد هنالك طرائق تقليدية لا زالت مستخدمة في أغلب المناطق التي تمتاز بوفرة مياهها السطحية , والتي يمكن تصنيفها على النحو الآتي :-

1- الري بالأحواض (Basin irrigation):-

يعتبر أكثر أنواع الري السطحي بساطةً وشيوعاً , وخصوصاً في منطقة الدراسة , إذ يتم الري من خلال تقسيم الحقل إلى أحواض مستوية محاطة بأكتاف ترابية , يتم تهيتها يدوياً أو ميكانيكياً بارتفاع (16-30) سم , فوق سطح الأرض . حيث توجه المياه إلى هذه الحوض إما من خلال مسقى مفتوح في أوله الحوض وبعد ملئه يصرف الماء الزائد من فتحة بنهاية الحوض إلى نظيره المجاور , أو من خلال مسقى يتم إنشائه في وسط الحقل المقسم إلى عدة أحواض , تفتح إحدى جوانبه باتجاه حوض حتى يمتلئ بالماء ثم تغلق وتفتح من جانب آخر باتجاه حوض ثاني وهكذا تستمر العملية حتى يسقى الحقل بالكامل . وتحدد مساحة الحوض حسب نوعية التربة وشكل الحقل وخبرة المزارع والمحصول المروري , إذ تقسم الأحواض في منطقة الدراسة بطول يتراوح بين (50-150) متر وعرض يتراوح بين (3-6) متر⁽¹⁾. الصور (5) و (6) .

صورة (6)

حقل زراعي مقسم بالأحواض
في مقاطعة (الثمانية)
التابعة لناحية الجدول الغربي



التقطت الصورة بتاريخ 2020/2/6

صور (5)

حقل زراعي مقسم بالأحواض
في مقاطعة (الوند)
التابعة لناحية الحسينية



التقطت الصورة بتاريخ 2020/2/16

وكذلك تتم عملة الري بالأحواض بأساليب مختلفة منها الري السيجي والري بواسطة المضخات والتي سنتناول كل منها على النحو التالي :-

¹ - مقابلة شخصية مع المزارع , جاسم محمد على المسعودي , ناحية الجدول الغربي , مقاطعة الثمانية , بتاريخ 2020/2/4 .

وقائع المؤتمر العلمي السنوي الثالث لقسم الجغرافيتا / كلية التربية الاساسيتا
الجامعة المستنصرية وتحت شعار
(الجغرافيا ودورها في اغناء المعرفة العلمية والتربويتا)
24-25 أيار 2021

أ- الري السيتي (Free flow irrigation):-

يعد هذا الأسلوب من أقدم الأساليب وأرخصها التي عرفها الإنسان عبر تاريخه الطويل , ولكن استخدامه يرتبط بوجود الأراضي المنخفضة ذات الانحدار التدريجي والتي يكون مستواها دون مستوى سطح المياه الجارية في الأنهار والجداول المائية التي تجاورها . وتعد مناطق أحواض النهار المطمورة بالغرين والمناطق المحصورة بين جداولها من المناطق التي يتبع فيها هذا الأسلوب و حيث يسلط الماء وفق هذا الأسلوب من المصدر الإروائي إلى الأراضي الزراعية . ويتم جريان الماء باتجاه تلك الأراضي بفعل الجاذبية الأرضية, ما لا يتطلب جهودا غير فتح منافذ الري الحقلية لتنساب منها المياه سياتا مع انحدار سطح الأرض⁽¹⁾.

ويتبع هذا النوع من الري في منطقة الدراسة في الأراضي الزراعية الواقعة ضمن الهندية التي يُغذيها مشروع ري الحلة – كفل , والتي تقدر مساحتها بحوالي (1205) دونم . وكذلك أغلب الأراضي الزراعية الواقعة ضمن مقاطعة الكمالية التابعة لناحية الحر التي يُغذيها جدول الكمالية وتفرعاته, والتي تبلغ مساحتها (4177) دونم . جدول (6) , خريطة (3) . وساعدت الخصائص الطبيعية المتمثلة بانحدار السطح والتربة الخصبة والمياه السطحية الوفيرة التي تمتاز بها هذه المناطق على اتباع هذا الأسلوب من الري فيها ودون غيرها من بقية الأراضي المستثمرة في منطقة الدراسة.

جدول (6)

الوحدات الإدارية المستخدمة لطريقة الري السيتي في محافظة كربلاء المقدسة لعام (2019)

| طريقة الري | الوحدات الإدارية | المساحة المزروعة (دونم) | النسبة المئوية |
|-------------|------------------|-------------------------|----------------|
| الري السيتي | قضاء الهندية | 1205 | 22.4 |
| | ناحية الحر | 4177 | 77.6 |
| المجموع | | 5382 | 100 |


المصدر :

- 1- استثمار الإستهبان , 2019 .
- 2- مديرية زراعة محافظة كربلاء , قسم التخطيط والمتابعة , بيانات غير منشورة , 2019 .

¹ - علياء سلمان البورضي , تقييم حالة الري بالمياه والاستخدام الأمثل للموارد المائية في منطقة الفرات الأوسط , رسالة ماجستير (غير منشورة) , مقدمة لقسم الجغرافيا , كلية التربية للبنات , جامعة الكوفة 2006,ص195.

خريطة (3)

التوزيع الجغرافي لطريقة الري السحي المستخدمة في محافظة كربلاء المقدسة لعام (2019)



المصدر : من عمل الباحثان بالاعتماد على بيانات الجدول (6)

ب- الري بالواسطة – المضخات: – (Irrigation with pumps) :-

ويقصد به استعمال الواسطة لرفع المياه من الأنهار والآبار لري الأراضي المرتفعة التي لا يمكن ريها سيحاً، أو البعيدة عن مجرى النهر، فقديمأ كان المزارعون يستعملون النواعير والكروود وسيلة لرفع المياه وإيصالها إلى الأراضي المرتفعة، وأما في الوقت الحاضر تستعمل المضخات التي تعمل بالديزل أو الكهرباء لرفع المياه من الأنهار والآبار وإيصالها إلى الأراضي المرتفعة أو البعيدة عن مجرى النهر. ويظهر استخدام هذا النوع من طرائق الري في إنتاج محصول القمح في ناحية الخيرات التي احتلت أعلى الرتب بمساحة تقدر بنحو (3992) دونم وهذا ما يؤلف نسبته (42.5%) من المجموع الكلي للمساحات المزروعة باستخدامها والتي تبلغ حوالي (9392) دونم، ثم تليها كل من ناحيتي الحسينية والحر بالمرتبة الثانية بمساحة تقدر (2200، 2010) دونم وهذا ما يؤلف نسبته (23.4) %، لكل منهما على التوالي، بينما احتلت كل من ناحية الجدول الغربي وقضاء كربلاء المرتبة الثالثة بمساحة قدرت بـ (836، 343) دونم وهذا ما يؤلف نسبته (8.9) %، (3.7) % لكل منهما على التوالي. جدول (7) خريطة (4).

وقائع المؤتمر العلمي السنوي الثالث لقسم الجغرافيتا / كلية التربية الاساسيتا
الجامعة المستنصرية وتحت شعار
(الجغرافيا ودورها في اغناء المعرفة العلمية والتربويتا)
2021-24 أيار

جدول (7)

الوحدات الإدارية المستخدمة لطريقة الري بالمضخات في محافظة كربلاء المقدسة لعام (2019)

| النسبة المئوية | المساحة المزروعة (دونم) | الوحدات الإدارية | طريقة الري |
|----------------|-------------------------|---------------------|------------------|
| 3.7 | 343 | قضاء كربلاء | الري بالمضخات |
| 21.5 | 2021 | ناحية الحر | |
| 23.4 | 2200 | ناحية الحسينية | |
| 42.5 | 3992 | ناحية الخيرات | |
| 8.9 | 836 | ناحية الجدول الغربي | |
| 100 | 9392 | المجموع | |


المصدر :

3- استمارة الإستبيان , 2019 .

4- مديرية زراعة محافظة كربلاء , قسم التخطيط والمتابعة , بيانات غير منشورة , 2019 .

خريطة (4)

التوزيع الجغرافي لطريقة الري بالمضخات المستخدمة في محافظة كربلاء المقدسة لعام (2019)



المصدر : من عمل الباحثان بالاعتماد على بيانات الجدول (7)

أما العدد الكلي للمضخات بنوعيتها (الديزل و الكهرياء) المستخدمة في منطقة الدراسة فقد بلغ حوالي (4717) مضخة . جدول (8) . منها (3750) مضخة تعمل بالديزل , والتي بلغ أعلى مجموع لها استعمل من جدول الحسينية (3039) وبقوة حصانيه (19232) حصان ,

وقائع المؤتمر العلمي السنوي الثالث لقسم الجغرافيتا / كلية التربية الاساسيتا
الجامعة المستنصرية وتحت شعار
(الجغرافيا ودورها في اغناء المعرفة العلمية والتربوية)
24-25 آيار 2021

أما من جدول بني حسن وصل عدد المضخات بالديزل (648) مضخة واقلها من الفرات حيث وصل عددها (63) مضخة . أما بالنسبة لمجموع المضخات الكهربائية فقد بلغ (967) مضخة وبقوة حصانيه بلغت مجموعها (7684) حصان , فقد بلغ اكثر عدد للمضخات الكهربائية في جدول الحسينية (866) مضخة وبقوة حصانيه (6966) حصان ثم (75) و(26) مضخة لكل من بني حسن و الفرات على التوالي .

جدول (8)

عدد المضخات المنصوبة على الأنهار في محافظة كربلاء لعام (2019)

| اسم الجدول | عدد مضخات الديزل | النسبة المئوية | القوة الحصانية | عدد مضخات الكهرباء | النسبة المئوية | القوة الحصانية | المجموع الكلي |
|------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|---------------|
| الحسينية | 3039 | 81.0 | 19232 | 866 | 89.6 | 6966 | 3905 |
| بني حسن | 648 | 17.3 | 3639 | 75 | 7.8 | 474 | 723 |
| الفرات | 63 | 1.7 | 404 | 26 | 2.7 | 244 | 89 |
| المجموع | 3750 | 100 | 23275 | 967 | 100 | 7684 | 4717 |

المصدر : مديرية الموارد المائية في محافظة كربلاء ، قسم المضخات ، بيانات غير منشورة , 2019 .

وقد اتضح لنا ومن خلال الدراسة الميدانية واستمارة الإستبيان التي أجراها الباحثان إن عدد المضخات المستخدمة في الحقول الزراعية الخاصة بمحصول القمح قد يتباين بين حقل زراعي وآخر تبعا لمساحة ذلك الحقل . جدول (9) .

جدول (9)

عدد المضخات المستخدمة حسب المساحات الزراعية للحقول (دونم) في محافظة كربلاء

عام (2019)

| عدد المضخات | المساحة المزروعة / دونم |
|-------------|-------------------------|
| 1 | 10 _ 1 |
| 2 _ 1 | 20 _ 11 |
| 3 _ 2 | 30 _ 21 |
| 4 _ 3 | 40 _ 31 |
| 5 _ 4 | 50 _ 41 |
| 10 _ 5 | 100 _ 51 |

المصدر : من عمل الباحثان , بالاعتماد على استمارة الإستبيان , 2019 .

وقائع المؤتمر العلمي السنوي الثالث لقسم الجغرافيتا / كلية التربية الاساسيتا
الجامعة المستنصرية وتحت شعار
(الجغرافيا ودورها في اغناء المعرفة العلمية والتربويتا)
24-25 أيار 2021

مميزات الري السطحي :-

أ- إمكانية ري الأراضي الزراعية بأقل التكاليف , وهذا ما يؤدي إلى استقرار الكثير من الأسر ومشاريع الري الكبرى التي تعد من مقومات تنمية المناطق الريفية لأسباب عدة منها⁽¹⁾ :-

- 1- زيادة إنتاج الغذاء لتلبية متطلبات النمو السكاني .
- 2- خلق وظائف ووسائل عمل لزيادة دخل سكان الريف الفقراء .
- 3- بناء مجمعات يسهل فيها تقديم الخدمات الضرورية للسكان .
- 4- انعاش الاقتصاد محليا وقوميا بزيادة الإنتاجية والحصول على العملة الأجنبية .
- 5- نظام الري فيه قابل للتعديل والتحسين لري مساحات إضافية وامتدادات جديدة لمشاريع قائمة.

6- استهلاك الطاقة فيها قليل يكون بواسطة الري المضخات إذا ما قورن بطرائق الري الأخرى ويكون غير مستهلك للطاقة أصلاً في الري السطحي.

ب- سهولة إدارة توزيع مياه الري بالحقل وذلك للأسباب الآتية :-

- 1- إمكانية إعطاء الريات خلال فترات متباعدة من خلال إضافة كمية من المياه الكافية لتغطية احتياجات المحصول لمدة لاحقة .
- 2- لا تحتاج إضافة المياه في الحقل إلى تقنية أو تعقيد , وإنما تعتمد كثيراً على خبرة المزارع ومهاراته المكتسبة بالممارسة ومعرفة له خواص حقله

مساوئ الري السطحي :-

لكل طريقة من طريقة ري طرق الري بعض المساوئ ولكن مساوئ طرائق الري السطحي تتعدد إذا ما قورنت بطرائق الري الأخرى , وإن ابرز هذه المساوئ هي⁽²⁾ :-

- 1- كفاءته المتدنية والتي تتراوح بين (40-60%) وهذا ما يعد هدراً للمياه .
- 2- يحتاج النظام إلى درجة عالية من التسطیح للأرض (تسوية الأرض) المروية الذي يكلف الكثير من الجهد والمال بل إن انتظام وتوزيع مياه الري في الحقل يعتمد كثيراً على ذلك .

3- يستقطع فيه جزء كبير من الأرض للقنوات والكتوف وبالتالي فإنها تخرج عن دائرة الإنتاج الزراعي في المشروع المروي . وهذا يعني هدراً في مساحة الأرض الزراعية بنسبة أقل من (30-50%) مقارنة بالمساحة الممكن زراعتها مع طرائق الري الأخرى .

4- صعوبة أداء العمليات الزراعية (رش المبيدات و الأسمدة) أثناء وبعد عملية الري بالحقل مباشرة وعليه يتم تأخيرها لمدة بين الريات .

5- الجداول القنوات الحقلية فيه تعيق حركة الآلات وعملية المكننة الزراعية.

¹ - بلدية , رياض عبد القادر وآخرون , الري والصرف , منشورات المعاهد الفنية الزراعية , جامعة دمشق , 2016, ص248.

² - المصدر نفسه , ص249.

وقائع المؤتمر العلمي السنوي الثالث لقسم الجغرافيت / كلية التربية الاساسيت
الجامعة المستنصرية وتحت شعار
(الجغرافيا ودورها في اغناء المعرفة العلمية والتربوية)
24-25 أيار 2021

- 6- سطح الماء المكشوف بالقنوات والجداول والحقول وما يصاحبه من تدفقات المياه حول الحقل المروي يخلق بيئة غير صحية في المنطقة المروية مما يؤدي إلى تفشي الأمراض.
- 7- تملح الأراضي الزراعية وتحول الكثير منها إلى أراضي غير صالحة للزراعة بسبب الزيادة الكبيرة في المياه المروية للحقول وتعرضها إلى عملية التبخر .
- 8- يسبب تلوث في المياه الجوفية نتيجة لتسرب مياه الري الزائدة إلى الطبقات العميقة.
- خامساً :- الاحتياجات المائية لمحصول القمح حسب تقانات الري الحديثة وطرائق الري التقليدية المستخدمة بزراعته في منطقة الدراسة :-**

يبدأ موعد زراعة القمح في منطقة الدراسة في أواسط شهر تشرين الثاني، وهو الموعد المفضل للزراعة ويستمر من (10-20) يوماً ، ولا يجب تأخير الزراعة بعد هذه المدة أو التكبير فيها لان ذلك يؤدي إلى قلة الحاصل ورداءه في النوعية , وتستمر مدة نمو المحصول (6) أشهر ، إذ يكون موعد النضج والحصاد في أواسط شهر نيسان . وخلال هذه المدة يحتاج محصول القمح إلى مياه الري لغرض إنباته وخاصة عند عدم توفر مياه أمطار الكافية لإنباته خلال مدة النمو. وتختلف كميات مياه الري التي يحتاجها المحصول وعدد رياته من مكان إلى آخر في منطقة الدراسة تبعاً لاختلاف المقنن المائي لطريقة الري المستخدمة وحجم المساحات المزروعة ونوع التربة السائدة⁽¹⁾. وبحسب حجم المساحات المستثمرة باستخدام طرائق الري التقليدية لإنتاج محصول القمح في منطقة الدراسة التي تقدر بحوالي (14774) دونم , والمقنن المائي للمحصول بهذه الطريقة والذي يقدر بـ (2143) م³/دونم , فإن كمية الاحتياج المائي للمحصول خلال مدة نموه تبلغ (31660682) م³ , وإن عدد رياته خلال مدة نموه , تقل أو تزيد اعتماداً على حالة الجو , فعندما يكون موسم زراعة المحصول مطيراً تقل فيه عدد الريات وتتباعد مواعيدها , إلا إن المحصول في حالة عدم سقوط أمطار خلال مدة نموه فإنه يحتاج إلى ري تكميلي بواقع (5 – 7) ريات منتظمة , تبدأ أولها بعد الزراعة مباشرة وآخرها بعد إكمال طور التزهير بين (15 – 25) نيسان . وأما المساحات المستثمرة باستخدام طرائق الري الحديثة في منطقة الدراسة التي تبلغ مساحتها (52150) دونم , وبحسب المقنن المائي للمحصول باستخدامها والذي يقدر بنحو (1286) م³/دونم , فإن الاحتياج المائي للمحصول خلال مدة النمو فيها بلغ (67064900) م³ , جدول (10) , وبسبب طبيعة ظروف المناخ السائدة من ارتفاع درجات الحرارة وقلة الأمطار وتذبذبها وكذلك طبيعة تربتها الرملية التي تكون ذات مسامية عالية تساعد على التسرب العميق للمياه , فإن معدل عدد ريات المحصول بواسطة منظومات الري بالرش الحديثة يتراوح بين (72 – 96) رية خلال الموسم الزراعي الواحد , وبواقع

¹ - مقابلة شخصية مع المزارع , مهدي خلف علوان , حي الهندية , مديرية أم الهوى , بتاريخ 2019/12/9.

وقائع المؤتمر العلمي السنوي الثالث لقسم الجغرافيتا / كلية التربية الاساسيتا
الجامعة المستنصرية وتحت شعار
(الجغرافيا ودورها في اغناء المعرفة العلمية والتربويتا)
24-25 آيار 2021

– (4) ريات في الاسبوع تقل أو تزيد حسب طبيعة الظروف المناخية وتقديرات المزارع نفسه⁽¹⁾.

جدول (10)

معدل الاحتياجات المائية لمحصول القمح في محافظة كربلاء المقدسة ومقدار المقنن المائي لطرائق الري المستخدمة فيها لعام (2019)

| طرائق الري | المساحات المزروعة / دونم | النسبة المئوية % | المقنن المائي م/3دونم | الاحتياج الكلي / م3 |
|------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| طرائق ري تقليدية | 14774 | 22.1 | 2143 | 31660682 |
| طرائق ري حديثة | 52150 | 77.9 | 1286 | 67064900 |
| المجموع | 66924 | 100 | - | 98725582 |

المصادر : مديرية زراعة محافظة كربلاء , قسم التخطيط والمتابعة , بيانات غير منشورة , 2019.

ويتبين لنا مما تقدم إن حجم الاستهلاك المائي للمناطق المستخدمة لطرائق الري الحديثة كان أقل من حجم الاستهلاك المائي لطرائق الري التقليدية بنسبة (67%)^{*} , وإنه لو استخدمنا طرائق الري الحديثة بدلاً عن طرائق الري التقليدية في منطقة الدراسة سنستطيع أن نوفر كميات من المياه لمساحة يبلغ قدرها (9846) دونم , والسبب في ذلك يعود إلى كفاءة طرائق الري الحديثة التي يمكن من خلالها التحكم في كمية المياه المضافة التي يصعب التحكم فيها عند استخدام طرائق الري التقليدية , إضافة إلى ما تمتاز به من عدم وجود فاقد للماء عند نقله من المصدر إلى الحقل , لأنه يتم عن طريق الأنابيب , بينما ينقل الماء بطرائق الري التقليدية بواسطة القنوات المبطنة أو الترابية المفتوحة والتي بسببها في كلا الحالتين يتعرض الماء إلى التبخر والنضح , فضلاً عن كمية من المياه الممتصة من النباتات والحشائش التي تنمو في هذه القنوات .

سادساً :- تأثير استخدام تقانات الري الحديثة على زراعة محصول القمح في محافظة كربلاء المقدسة:-

لم تكن محافظة كربلاء المقدسة تشهد أي استخدام لطرائق الري الحديثة في زراعة محصول القمح ما قبل عام (2010) وكان المزارعين المنتجين للقمح فيها يعتمدون على استخدام طرائق الري التقليدية المتمثلة (بالري السحي والري بالواسطة) وما بعد علم (2010) وبالتحديد خلال الموسم الزراعي (2010-2011) بدأ الاستخدام الأول لطرائق الري الحديثة في المحافظة في الأراضي الصحراوية التابعة لقضاء عين التمر حيث كانت المساحات المستثمرة خلالها تقدر بنحو (650) دونم

¹ - استمارة الإستمابان , 2019

* إن هذه النسبة حددت على أساس مقارنة حجم المساحات المستثمرة بطرائق الري التقليدية البالغة (14774) دونم , بالمساحة التي تساويها باستخدام طرائق الري الحديثة .

وقائع المؤتمر العلمي السنوي الثالث لقسم الجغرافيتا / كلية التربية الاساسيتا
الجامعة المستنصرية وتحت شعار
(الجغرافيا ودورها في اغناء المعرفة العلمية والتربويتا)
24-25 آيار 2021

وهي ما تعادل نسبة (4%) من مجموع مساحة الأراضي المزروعة خلاله والتي تقدر بنحو (16370) دونم , وإن إنتاجها بلغ حوالي (553) طن , وهو ما يعادل نسبة (5.8%) من إنتاج المحافظة الكلي الذي يبلغ (9586) طن , في الوقت الذي كانت فيه مجموع مساحة الأراضي المستثمرة بواسطة الري بالمضخات تبلغ (9110) دونم , وبنسبة (55.6%) والمساحات المستثمرة بواسطة الري السحي تبلغ (6610) دونم , وبنسبة (40.4%) من المجموع الكلي للمساحة المزروعة , وإن إنتاج كل منها على التوالي كان يبلغ (5233 و 3800) طن , وبنسبة (54.6% و 39.6%) من إنتاج المحافظة الكلي. جدول (11) .

جدول (11)

المساحات المزروعة قمحاً باستخدام طرائق الري في محافظة كربلاء المقدسة خلال الموسم الزراعي (2010-2011)

| النسبة المنوية % | انتاج طن | الإنتاجية كغم | النسبة المنوية % | المساحات المروية دونم | طرائق الري المتبع فيها | الوحدات الإدارية |
|---------------------|-------------|------------------|---------------------|--------------------------|---|---------------------|
| 0.3 | 29 | 478 | 0.4 | 60 | طرائق ري تقليدية (ري بالمضخات) من مياه الآبار | قضاء كربلاء |
| 17.5 | 1680 | 560 | 18.3 | 3000 | طرائق ري تقليدية (ري سحي) | ناحية الحر |
| 5.7 | 543 | 543 | 6.1 | 1000 | طرائق ري تقليدية (ري بالمضخات) | |
| 9.3 | 894 | 542 | 10.1 | 1650 | طرائق ري تقليدية (ري بالمضخات) | ناحية الحسينية |
| 18.8 | 1800 | 600 | 18.3 | 3000 | طرائق ري تقليدية (ري سحي) | قضاء الهندية |
| 16.8 | 1612 | 560 | 17.6 | 2879 | طرائق ري تقليدية (ري بالمضخات) | ناحية الخيرات |
| 22.5 | 2155 | 612 | 21.5 | 3521 | طرائق ري تقليدية (ري بالمضخات) | ناحية الجدول الغربي |
| 3.3 | 320 | 525 | 3.7 | 610 | طرائق ري تقليدية (ري سحي) بواسطة العيون | قضاء عين التمر |
| 5.8 | 553 | 850 | 4.0 | 650 | طرائق ري حديثة (الري بالرش المحوري والثابت) | |
| 100 | 9586 | - | 100 | 16370 | | المجموع |

المصدر : مديرية زراعة محافظة كربلاء , قسم التخطيط والمتابعة , بيانات غير منشورة , 2019 .
وما بعد ذلك بدأت المحافظة تشهد توسعاً ملحوظاً في استخدام طرائق الري الحديثة عاماً بعد عام حتى أصبحت المساحات المستثمرة باستخدامها خلال الموسم الزراعي (2018-2019) تشكل النسبة الأكبر من مجموع المساحات المستثمرة بطرائق الري الأخرى في المحافظة , إذ بلغت حوالي (52150) دونم وهي ما تعادل نسبة (77.9%) من مجموع المساحة الكلية المستثمرة في المحافظة التي تبلغ (66924) دونم , وإن كمية إنتاجها بلغ (57422) طن , أي

وقائع المؤتمر العلمي السنوي الثالث لقسم الجغرافيتا / كلية التربية الاساسيتا
الجامعة المستنصرية وتحت شعار
(الجغرافيا ودورها في اغناء المعرفة العلمية والتربويتا)
24-25 آيار 2021

ما يعادل بنسبة (83.6%) من الإنتاج الكلي في المحافظة والذي يبلغ (68713) طن. وأما الأراضي المستثمرة بواسطة الري بالمضخات فقد بلغت مجموع مساحتها (9392) دونم , وهي ما تشكل بنسبة (14 %) من مجموع المساحة المستثمرة في المحافظة خلال هذا الموسم, ويقدر مجموع كمية إنتاجها بنحو (6909) طن , أي ما يعادل نسبة (10 %) من إنتاج المحافظة الكلي . في حين بلغ مجموع مساحة الأراضي المستثمرة بالري السحي (5382) دونم , وبنسبة (8.1%) من مجموع مساحة الأراضي المزروعة قمحاً في المحافظة , في حين بلغ إنتاجها (4382) طن, وهو ما يعادل نسبة (6.4%), من مجموع إنتاج المحافظة الكلي. جدول(12).

جدول (12)

المساحات المزروعة قمحاً باستخدام طرائق الري في محافظة كربلاء المقدسة خلال الموسم الزراعي (2018-2019)

| النسبة المنوية % | انتاج طن | الإنتاجية كغم | النسبة المنوية % | المساحات المروية دونم | طرائق الري المتبع فيها | الوحدات الإدارية |
|---------------------|-------------|------------------|---------------------|--------------------------|---|---------------------|
| 0.3 | 233 | 680 | 0.5 | 343 | طرائق ري تقليدية (ري بالمضخات) من مياه الآبار | قضاء كربلاء |
| 5.0 | 3465 | 1250 | 4.1 | 2772 | طرائق ري حديثة (الري بالرش المحوري والثابت) | |
| 4.7 | 3237 | 775 | 6.3 | 4177 | طرائق ري تقليدية (ري سحي) | ناحية الحر |
| 2.3 | 1546 | 765 | 3.0 | 2021 | طرائق ري تقليدية (ري بالمضخات) | |
| 13.8 | 9506 | 1060 | 13.4 | 8968 | طرائق ري حديثة (الري بالرش المحوري والثابت) | ناحية الحسينية |
| 2.3 | 1584 | 720 | 3.3 | 2200 | طرائق ري تقليدية (ري بالمضخات) | |
| 1.7 | 1145 | 950 | 1.8 | 1205 | طرائق ري تقليدية (ري سحي) | قضاء الهندية |
| 4.1 | 2794 | 700 | 6.0 | 3992 | طرائق ري تقليدية (ري بالمضخات) | ناحية الخيرات |
| 1.1 | 752 | 900 | 1.2 | 836 | طرائق ري تقليدية (ري بالمضخات) | ناحية الجدول الغربي |
| 64.7 | 44451 | 1100 | 60.4 | 40410 | طرائق ري حديثة (الري بالرش المحوري والثابت) | قضاء عين التمر |
| 100 | 68713 | - | 100 | 66924 | | المجموع |

المصدر :

- 1- مديرية زراعة محافظة كربلاء , قسم التخطيط والمتابعة , بيانات غير منشورة , 2019 .
- 2- الباحثان بالاعتماد على استمارة الإستيبيان .

وقائع المؤتمر العلمي السنوي الثالث لقسم الجغرافيت / كلية التربية الاساسية
الجامعة المستنصرية وتحت شعار
(الجغرافيا ودورها في اغناء المعرفة العلمية والتربوية)
24-25 ايار 2021

ومن خلال المقارنة بين الموسم الزراعي (2010-2011) الذي يمثل الموسم الأول لاستخدام طرائق الري الحديثة في منطقة الدراسة وبين الموسم الزراعي (2018-2019) الذي يمثل المدى الذي وصلت حجم المساحات المزروعة بمحصول القمح نتيجة للتوسع في استخدام طرائق الري الحديثة , نلاحظ أن هنالك زيادة واضحة في حجم المساحات المزروعة بمحصول القمح في عموم المحافظة بلغت نسبتها (309%) والتي من خلالها زادت كمية الإنتاج في المحافظة بنسبة (617%) على ما كانت عليه في الموسم الزراعي (2010-2011) * . ومن هذه الزيادة الحاصلة في حجم المساحات المستثمرة بإنتاج محصول القمح في منطقة الدراسة شكلت مساحات الأراضي المستخدمة لطرائق الري الحديثة النسبة الأكبر من الزيادة فيها وبحوالي (7923%) على ما كانت عليه في الموسم الأول لاستخدامها نتيجة للتوسع المستمر في استثمار المناطق الصحراوية التي تشكل النسبة الأكبر في عموم المحافظة وبسبب ما تمتاز به هذه الطرائق من كفاءة إروائية العالية أدت إلى زيادة نسب الإنتاج في هذه المناطق المستخدمة لها بحوالي (10284%) . وأما المساحات المستخدمة لطرائق الري التقليدية فقد تراجعت نسبتها بحوالي (6.2%) نتيجة لتترك بعض الأراضي الزراعية من قبل بعض المزارعين بورا دون استثمارها بسبب تدهور طبيعتها نتيجة لما خلفه استخدام هذه الطرائق من تملح للتربة وتغدقها من جهة , وقلة الإطلاقات المائية وتباين كمياتها خلال المواسم الزراعية المتتالية والتي على ضوءها تحدد الجهات المسؤولة مساحة الأراضي الزراعية التي يمكن أن توفر لها الكميات الكافية من الاحتياجات المائية ضمن المناطق المعتمدة على المياه السطحية , من جهة أخرى .

ولكن كمية إنتاج هذه المساحات كان أعلى بنسبة (25%) عما كانت عليه في الموسم الزراعي (2010-2011) , نتيجة لاستخدام المزارعين لأصناف جديدة البذور المهجنة التي تمتاز بمقاومتها للظروف الحياة النباتية الصعبة مثل بذور (إباء99) التي تستخدم حاليا في منطقة الدراسة , وكذلك استخدامهم لأنواع جديدة وجيدة من الأسمدة والمبيدات التي يجهز بعضها للمزارعين من قبل الدوائر الحكومية المعنية وبعضها الآخر يتم شراؤه من الأسواق المحلية . التي ساعدت هي الأخرى على زراة الإنتاج في هذه المناطق (دراسة ميدانية, 2019).

الاستنتاجات :-

1- إن أهم تقانات الري المستخدمة في إنتاج محصول القمح في محافظة كربلاء المقدسة تمثلت بطرائق الري بالرش (المحوري والثابت) كونها الطرائق الأنسب والأفضل لزراعة محصول القمح

* تم استخراج معدل زيادة التغيير الحاصل في المساحة المزروعة بمحصول القمح وإنتاجها من خلال المعادلة الآتية :

$$\text{معدل التغيير} = \left[\frac{\text{القيمة الجديدة} - \text{القيمة القديمة}}{\text{القيمة القديمة}} \right] \times 100.$$

المصدر : محمود عواد , الإدارة بالأرقام , دار ثقافة , الإمارات , ط1 , 2008 , ص159.

وقائع المؤتمر العلمي السنوي الثالث لقسم الجغرافيت / كلية التربية الاساسية
الجامعة المستنصرية وتحت شعار
(الجغرافيا ودورها في اغناء المعرفة العلمية والتربوية)
24-25 ايار 2021

- والتي تعتبر صورة من صور المحاكات للأقطار . كما وتستخدم طرائق ري تقليدية آخر في إنتاج محصول القمح تمثلت بـ (الري السحي , الري بالمضخات) .
- 2- إن الامتداد الواسع للأراضي وخاصة في المناطق الصحراوية من المحافظة والمتمثلة بقضائي كربلاء وعين التمر والجزء الجنوبي من ناحية الحر) ساعد على التوسع في استثمار مساحات كثيرة من الأراضي في إنتاج محصول القمح باستخدام التقانات الحديثة معتمدين على ما في باطنها من مياه جوفية , بعكس المناطق الأخرى التي يعيق التوسع في استثمارها محدودية مساحاتها وتداخلها مع الأراضي البستنية وتقطعها بجداول النهرية والمبازل وتفرعاتها.
- 3- إن محدودية المساحات المزروعة وتقطعها في المناطق التي تعتمد على طرائق الري التقليدية بسبب وجود مجاري الأنهار والمبازل وتفرعاتها من جهة وتداخلها مع الأراضي البستنية من جهة أخرى حال بالمزارعين دون استخدامهم لبعض تقانات الري الحديثة (المرشاة المحورية) في هذه المناطق وإن ارتفاع التكاليف المادية لشراء منظومات الري الحديثة الأخرى (المرشاة الثابتة) حالة هي الأخرى دون استخدام المزارعين لها في هذه المناطق إذا ما قورنت بمحدودية العائدات المادية التي يحصل عليها المزارعون نتيجة لمحدودية الإنتاج الناتج عن محدودية المساحات المزروعة .
- 4- إن حجم الاستهلاك المائي للمناطق المستخدمة لتقانات الري الحديثة كان أقل من حجم الاستهلاك المائي لطرائق الري التقليدية بنسبة (67%) وإنه لو استخدمنا تقانات الري الحديثة بدلاً عن طرائق الري التقليدية في منطقة الدراسة سنستطيع أن نوفر كميات من المياه لمساحة يبلغ قدرها (9846) دونم والسبب في ذلك يعود إلى كفاءة لتقانات الري الحديثة التي يمكن من خلالها التحكم في كمية المياه المضافة التي يصعب التحكم فيها عند استخدام طرائق الري التقليدية , إضافة إلى ما تمتاز به من عدم وجود فاقد للماء عند نقله من المصدر إلى الحقل , لأنه يتم عن طريق الأنابيب , بينما ينقل الماء بطرائق الري التقليدية بواسطة القنوات المبطنة أو الترابية المفتوحة والتي بسببها في كلا الحالتين يتعرض الماء إلى التبخر والنضح, فضلاً عن كمية من المياه الممتصة من النباتات والحشائش التي تنمو في هذه القنوات .
- 5- إن لاستخدام تقانات الري الحديثة في منطقة الدراسة انعكاساً إيجابياً واضحاً على إنتاجية محصول القمح في منطقة الدراسة , إذ تبين لنا من خلال الدراسة الميدانية واستمارة الإستبيان إن متوسط إنتاجية الدونم الواحد من محصول القمح يتراوح (1060-1250) كغم , في المناطق الصحراوية المستخدمة لتقانات الري الحديثة المتمثلة بقضائي وكربلاء وعين تمر والمناطق الجنوبية الصحراوية من ناحية الحر, بينما كان معدل متوسط إنتاجية الدونم الواحد في بقية الوحدات الإدارية التي تستخدم طرائق الري التقليدية (الري السطحي) تتراوح بين (680-950) كغم في الدونم الواحد .
- 6- إن أهم المشاكل التي تواجه استخدام طرائق الري الحديثة هي (الدعم الحكومي, والوقود, ومشكلة الصيانة) .
- 7- إن المساحات المستثمرة باستخدام طرائق الري الحديثة خلال الموسم الزراعي (2018-2019) تشكل النسبة الأكبر من مجموع المساحات المستثمرة بطرائق الري الأخرى في المحافظة , إذ بلغت حوالي (52150) دونم وهي ما تعادل نسبة (77.9%) من مجموع المساحة الكلية المستثمرة في

وقائع المؤتمر العلمي السنوي الثالث لقسم الجغرافيتا / كلية التربية الاساسيتا
الجامعة المستنصرية وتحت شعار
(الجغرافيا ودورها في اغناء المعرفة العلمية والتربويتا)
24-25 آيار 2021

المحافظة التي تبلغ (66924) دونم, وإن كمية إنتاجها بلغ (57422) طن, أي ما يعادل بنسبة (83.6%) من الإنتاج الكلي في المحافظة والذي يبلغ (68713) طن . وأما الأراضي المستثمرة بواسطة الري بالمضخات فقد بلغت مجموع مساحتها (9392) دونم, وهي ما تشكل بنسبة (14%) من مجموع المساحة المستثمرة في المحفظة خلال هذا الموسم, ويقدر مجموع كمية إنتاجها بنحو (6909) طن , أي ما يعادل نسبة (10%) من إنتاج المحافظة الكلي. في حين بلغ مجموع مساحة الأراضي المستثمرة بالري السحي (5382) دونم, وبنسبة (8.10%) من مجموع مساحة الأراضي المزروعة قمحاً في المحافظة , في حين بلغ إنتاجها (4382) طن , لتعادل بهذا نسبة (6.4%), من مجموع إنتاج المحافظة الكلي.

8- إن الاستخدام الأول لتقانات الري الحديثة في منطقة الدراسة بدأ خلال الموسم الزراعي (2010-2011) على مساحة قدرت بـ (650) دونم , وهي بهذا كانت تشكل نسبة (4%) من مجموع المساحة المزروعة خلاله والتي قدرت بـ (16370) دونم , وشكلت نسبة إنتاجها (5.8%) من إنتاج المحافظة الكلي والذي كان يبلغ (9586) طن.

9- التوسع في استخدام تقانات الري الحديثة في إنتاج محصول القمح في محافظة كربلاء نتيجة لكفائتها الإروائية العالية , والذي ساعد على التوسع في زيادة المساحات المزروعة قمحاً , فبينما كانت المساحة المزروعة قمحاً تقدر بـ (16370) دونم خلال الموسم الزراعي (2010-2011) والذي يعد الموسم الأول لاستخدام طرائق الري الحديثة (الري بالرش) , أصبحت تقدر بـ (66924) دونم خلال الموسم الزراعي (2018-2019) ونتيجة لذلك زادت كمية الإنتاج بشكل ملحوظ حيث إنها وصلت إلى (68713) طن بعد إذ كانت تبلغ (9586) طن خلال الموسم الزراعي (2010-2011) .

التوصيات :-

1- تشجيع المزارعين المستخدمين لطرائق الري التقليدية وحثهم على تركها واستخدام طرائق الري الحديثة بدلاً عنها من خلال تزويدهم بمنظومات الرش الحديثة , وبيعها لهم بأسعار مدعومة عن طريق التبسيط المريح , وخاصة المزارعين الذين يعتمدون في ري حقولهم الزراعية على المياه السطحية لأن أغلب المنظومات التي توفرها الدولة في بعض الأحيان للمزارعين في منطقة الدراسة تمنح لمن يرغب في استثمار مناطق جديدة في الجانب الصحراوي منها.

2- رفع القيمة الشرائية التسويقية لمحصول القمح والتي من خلالها سيسعى المزارعين لبذل كافة الجهود واستخدام أفضل التقانات الحديثة التي تساعد على زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته لأنها بالتالي سوف تعود بالربح الوفير عليهم .

3- عمل ندوات إرشادية أو إقامة دورات خاصة حول أهم الأعطال التي تواجه استخدام طرائق الري الحديثة وسبل معالجتها كون أن المحافظة تعاني من قلة عدد العاملين في مجال صيانة منظومات الري الحديثة .

4- العمل على صرف مستحقات المزارعين المالية بأسرع وقت ممكن لأن ذلك سيساعدهم على توفير متطلبات العملية الإنتاجية للمحصول للموسم اللاحق .

وقائع المؤتمر العلمي السنوي الثالث لقسم الجغرافيت / كلية التربية الاساسيت
الجامعة المستنصرية وتحت شعار
(الجغرافيا ودورها في اغناء المعرفة العلمية والتربوية)
24-25 أيار 2021

المصادر:

أولاً: الكتب: -

- [1] البطحي ، عبد الرزاق محمد ، الاستخدام الأمثل لتقنيات التصنيف الكمي في الدراسات الجغرافية ، بغداد ، مطبعة التعليم العالي ، 1989 .
- [2] الحديثي، عصام خضير، وآخرون ، تقانات الري الحديثة ، ط1 ، كلية الزراعة، جامعة الأنبار ، 2010.
- [3] الزبيدي ، أحمد حيدر ، ملوحة التربة ، دار الحكمة ، بغداد 1989.
- [4] الغباري ، حسين بن محمد ، إدارة وتنمية موارد المياه والري ، دار جامعة الملك سعود ، الرياض ، 2013.
- [5] بلدية ، رياض عبد القادر وآخرون ، الري والصرف ، منشورات المعاهد الفنية الزراعية ، جامعة دمشق ، 2016.
- [6] كيلر ، جاك ، رون بليجرز ، الري بالرش والري بالتنقيط ، ترجمة عبد الرحمن بن علي العذبة ، دار جامعة الملك سعود ، الرياض ، 2014.
- [7] محمود عواد ، الإدارة بالأرقام ، دار ثقافة ، الإمارات ، ط1 ، 2008 .

ثانياً: الرسائل والأطروحات: -

- [1] علياء سلمان البو رضي ، تقييم حالة الري بالمياه والاستخدام الأمثل للموارد المائية في منطقة الفرات الأوسط ، رسالة ماجستير (غير منشورة) ، مقدمة لقسم الجغرافيا ، كلية التربية للبنات ، جامعة الكوفة 2006.
- [2] خلف ، قيس ياسين ، استخدام التقنيات الحديثة في الاستثمار الأمثل لموارد المياه السطحية وأثرها في زيادة المساحات المزروعة في محافظة ديالى ، رسالة دكتوراه (غير منشورة) ، مقدمة لقسم الجغرافيا ، كلية التربية ، الجامعة. ديالى 2014.

ثالثاً: المقابلات الشخصية: -

- [1] مقابلة شخصية مع المهندس الزراعي أحمد نعمه عبد الأمير ، رئيس فريق الهيئة الزراعية في مديرية الزراعة بمحافظة كربلاء المقدسة ، 2019/12/14 م.
- [2] مقابلة شخصية مع المزارع ، جاسم محمد على المسعودي ، ناحية الجدول الغربي ، مقاطعة الثمانية ، بتاريخ 2020/2/4 .
- [3] مقابلة شخصية مع المزارع ، مهدي خلف علوان ، حي الهندية ، مديرية أم الهوى ، بتاريخ 2019/12/9.

وقائع المؤتمر العلمي السنوي الثالث لقسم الجغرافيت / كلية التربية الاساسية
الجامعة المستنصرية وتحت شعار
(الجغرافيا ودورها في اغناء المعرفة العلمية والتربوية)
24-25 أيار 2021

رابعاً: الدراسة الميدانية 2019.
خامساً: استمارة الاستبيان 2019.

ملحق (1)

استمارة الإستبيان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أخي المزارع الكريم
تحية طيبة

إن هذه الاستمارة تتضمن أسئلة خاصة بدراسة (تأثير استخدام طرائق الري على إنتاج محصول القمح في محافظة كربلاء المقدسة) و هي جزء من متطلبات الحصول على درجة الماجستير في الجغرافية .

لذا نرجو منكم التفضل بالإجابة على جميع الأسئلة المدرجة أدناه ، دون ذكر الاسم ، علماً إن هذه المعلومات التي سيتم الحصول عليها من خلال إجاباتكم الكريمة سوف تستعمل لأغراض البحث العلمي ، شاكرين تعاونكم معنا في ملأ هذه الاستمارة
مع فائق الشكر والتقدير

1- موقع المزرعة ؟

المحافظة () ، القضاء () ، الناحية () ، المقاطعة () ، رقم المقاطعة () .

2- التحصيل الدراسي لصاحب المزرعة ؟ (اجب بوضع إشارة ✓)

- لا يقرأ ولا يكتب () ، ابتدائية () ، متوسطة () ، إعداديه () ، معهد أو كلية () ، دراسات عليا () .

3- مساحة الأرض الزراعية ؟ (اجب بوضع إشارة ✓)

- (10-1) دونم ()

- (20-11) دونم ()

- (30-21) دونم ()

- (40-31) دونم ()

- (50-41) دونم ()

- (100-51) دونم ()

- (500-100) دونم ()

- (1000-500) دونم ()

4- نوع الحيازة الزراعية ؟ (اجب بوضع إشارة ✓)

- ملك صرف ()

- عقدة ()

- إيجار ()

• اذا كان الجواب (إيجار) فكم هي أجرتها ؟

وقائع المؤتمر العلمي السنوي الثالث لقسم الجغرافيت / كلية التربية الاساسيت
الجامعة المستنصرية وتحت شعار
(الجغرافيا ودورها في اغناء المعرفة العلمية والتربويت)
2021-24 أيار

- 5- هل تقوم أنت و عائلتك بإدارة المزرعة ومتابعتها , أم هنالك عدد من العمال تستأجرهم لذلك ؟
(اجب بوضع إشارة ✓)
- انا و عائلتي من يدير المزرعة ويتابعها ()
- أستأجر العمال لإدارة المزرعة ومتابعتها ()
• اذا كنت تستأجر العمال لإدارة المزرعة ومتابعتها فكم هو عددهم ؟
-
• كم أجرة العامل الواحد منهم؟
-
• ما تحصيلهم الدراسي ؟ (اجب بوضع إشارة ✓)
- لا يقرأ ولا يكتب () , ابتدائية () , متوسطة () , إعداديه () , معهد أو كلية () ,
دراسات عليا () .
6- ما مصدر مياه الري في المزرعة :- (اجب بوضع إشارة ✓)
- نهر ()
- مشروع إروائي ()
- مياه جوفية ()
- مياه ميازل ()
7- ما طرائق الري المستخدمة في المزرعة ؟ (اجب بوضع إشارة ✓)
أ- طرائق ري تقليدية ()
ب- طرائق ري حديثة ()
8- اذا كان جوابك على الفقرة (أ - طرائق ري تقليدية)
• فما نوع طريقة الري التقليدية التي تستخدمها ؟ (اجب بوضع إشارة ✓)
- الري السحي ()
- الري بالواسطة - المضخات ()
• اذا كنت تستخدم الري السحي :-
- كم عدد الريات التي يحتاجها المحصول بهذه الطريقة () .
• اذا كنت تستخدم الري بواسطة المضخات :-
- كم عدد الريات التي يحتاجها المحصول بهذه الطريقة ؟
- كم عدد المضخات المستخدمة في مزرعتك ؟
- كم المساحة الزراعية التي تروى بواسطة المضخة الواحدة ؟
- كم الوقت الذي يستغرقه تشغيل المضخة في كل رية ؟
- كم قوة المضخات التي تستخدمها في مزرعتك ؟

وقائع المؤتمر العلمي السنوي الثالث لقسم الجغرافيت / كلية التربية الاساسيت
الجامعة المستنصرية وتحت شعار
(الجغرافيا ودورها في اغناء المعرفة العلمية والتربوية)
24-25 أيار 2021

- كم تبلغ تكلفة شراء المضخة الواحدة؟ وهل هي مدعومة من قبل الدولة؟
- كم تكلفة شراء الوقود الخاص بتشغيل المضخة؟ وهل هو مدعوم من قبل الدولة؟
• لماذا لا تستخدم الطرق الحديثة بالري؟ (اجب بوضع إشارة ✓)
- هل لأنك لا تجيد استخدامها ()
- بسبب تكاليفها المادية ()
- بسبب وفرة المياه السطحية ()
• هل لديك أسباب أخرى تمنعك عن استخدام طرائق الري الحديثة تود ذكرها؟
(اجب بوضع إشارة ✓)
- نعم ()
- كلا ()
• اذا كان الجواب (نعم) فما هي هذه الأسباب؟
9- اذا كان جوابك على الفقرة (ب - طرائق ري حديثة)
• فما نوع منظومة الري بالرش التي تستخدمها؟ (اجب بوضع إشارة ✓)
- منظومة رش محورية ()
- منظومة رش ثابتة ()
- الاثنين معاً - الرش المحوري والثابت - ()
• كم عدد منظومات الري في مزرعتك؟
- عدد منظومات الري بالرش المحورية ()
- عدد منظومات الري بالرش الثابتة ()
• كم يبلغ سعر المنظومة الواحدة؟ وهل هي مدعومة من قبل الدولة؟
- منظومة الرش المحورية ()
- منظومة الرش الثابتة ()
• كم المساحة التي ترويهها المنظومة الواحدة؟
- المساحة التي ترويهها منظومة الرش المحورية هي ()
- المساحة التي ترويهها منظومة الرش الثابتة هي ()
• كم معدل وقت تشغيل المنظومة خلال اليوم الواحد؟ وكم مرة يتم ذلك خلال الأسبوع؟
- وقت التشغيل خلال اليوم الواحد ()
- عدد مرات التشغيل خلال الأسبوع الواحد ()
• كم تكلفة شراء الوقود الخاص بتشغيل المضخة؟ وهل هو مدعوم من قبل الدولة؟
• هل يتوفر كادر هندسي لصيانة الأعطال في المنظومة؟ (اجب بوضع إشارة ✓)
- نعم () - كلا ()
• اذا كان الجواب (نعم) فكم عددهم , وكم هي أجرتهم؟

وقائع المؤتمر العلمي السنوي الثالث لقسم الجغرافيت / كلية التربية الاساسيت
الجامعة المستنصرية وتحت شعار
(الجغرافيا ودورها في اغناء المعرفة العلمية والتربويت)
2021-24 أيار

-
-
- عدد الكادر الهندسي لصيانة المنظومة هو ()
- أجرتهم ()
• ما سبب اختيارك لطرائق الري الحديثة؟ (اجب بوضع إشارة ✓)
- كفاءتها عالية ()
- إنتاجها عالي ()
- اقتصار الوقت والجهد ()
• هل لديك أسباب أخرى دفعتك لاستخدام طرائق الري الحديثة تود ذكرها؟
(اجب بوضع إشارة ✓)
- نعم ()
- كلا ()
• اذا كان الجواب (نعم) فما هي هذه الأسباب؟
10- ما المشاكل الطبيعية التي تواجه وسائل الري في مزرعتك؟ (اجب بوضع إشارة ✓)
- طبغرافية السطح الغير مستوية ()
- ملوحة التربة ()
- تغدق التربة ()
- قلة الموارد المائية ()
- الترسيبات في القنوات الإروائية ()
- الآفات الزراعية (الأدغال والأمراض) ()
• هل لديك مشاكل طبيعية أخرى تود ذكرها؟ (اجب بوضع إشارة ✓)
- نعم ()
- كلا ()
• اذا كان الجواب (نعم) فما هي هذه المشاكل؟
• ما مدى تأثير المشكلة أعلاه على الإنتاج في مزرعتك؟ (اجب بوضع إشارة ✓)
- كبير () - متوسط () - قليل ()
• هل المشكلة تمت السيطرة عليها؟ (اجب بوضع إشارة ✓)
- نعم ()
- كلا ()
• اذا كان الجواب (نعم) فكيف كان ذلك؟
11- ما المشاكل البشرية التي تواجه وسائل الري في مزرعتك؟ (اجب بوضع إشارة ✓)
- قلة الحصاة المائية ()
- اليد العاملة ()
- ضعف الخبرة العلمية ()

وقائع المؤتمر العلمي السنوي الثالث لقسم الجغرافيت / كلية التربية الاساسيت
الجامعة المستنصرية وتحت شعار
(الجغرافيا ودورها في اغناء المعرفة العلمية والتربوية)
24-25 أيار 2021

-
-
- استثمار الحيازة الزراعية ()
- قلة رؤوس الأموال ()
• هل لديك مشاكل بشرية أخرى تود ذكرها ؟ (اجب بوضع إشارة ✓)
- نعم ()
- كلا ()
• اذا كان الجواب (نعم) فما هي هذه المشاكل ؟
• ما مدى تأثير المشكلة أعلاه على الإنتاج في مزرعتك ؟ (اجب بوضع إشارة ✓)
- كبير () - متوسط () - قليل ()
• هل المشكلة تمت السيطرة عليها ؟ (اجب بوضع إشارة ✓)
- نعم ()
- كلا ()
• اذا كان الجواب (نعم) فكيف كان ذلك ؟
12- هل يوجد مبرر للمزرعة ؟ (اجب بوضع إشارة ✓)
- نعم ()
- كلا ()
• اذا كان الجواب (كلا) فلماذا لا تقوم بإنشاء مبرر لمزرعتك ؟
13- هل تقوم الدولة بمنحكم قروض مالية لتحسين الواقع الزراعي وتحقيق الزيادة في الإنتاج ؟
(اجب بوضع إشارة ✓)
- نعم ()
- كلا ()
• اذا كان الجواب (نعم) فكم تبلغ هذه القروض الممنوحة لكم من قبل الدولة ؟
14- هل تتبع نظام الدورة الزراعية في مزرعتك ؟ ولماذا ؟ (اجب بوضع إشارة ✓)
- نعم ()
- كلا ()
15- ما نوع البذور التي تستخدمها في مزرعتك لإنتاج محصول القمح ؟ وكم هي تكاليفها ؟
- نوع البذور هو ()
- تكاليفها ()
16- كم يبلغ معدل غلة إنتاج القمح لدونم الواحد في مزرعتك ؟
17- كم تبلغ تكلفة حصاد المحصول المنتج في مزرعتك ؟
18- هل تقوم باستخدام المخصبات الزراعية ؟ (اجب بوضع إشارة ✓)
- نعم ()
- كلا ()

وقائع المؤتمر العلمي السنوي الثالث لقسم الجغرافيت / كلية التربية الاساسيت
الجامعة المستنصرية وتحت شعار
(الجغرافيا ودورها في اغناء المعرفة العلمية والتربويت)
24-25 أيار 2021

-
-
- اذا كان الجواب (نعم) فما هو نوعها , وكم تبلغ تكاليفها ؟
- نوع المخصبات ()
- تكاليفها ()
19- هل تقوم باستخدام مبيدات الأدغال في مزرعتك ؟ (اجب بوضع إشارة ✓)
- نعم ()
- كلا ()
- اذا كان الجواب (نعم) فما هو نوعها , وكم تبلغ تكاليفها ؟
- نوع المبيدات ()
- تكاليفها ()
20- هل تكافح الأمراض التي يتعرض لها المحصول خلال فترة النمو؟ (اجب بوضع إشارة ✓)
- نعم ()
- كلا ()
- اذا كان الجواب (نعم) فما هي المادة التي تكافح بها , وكم تبلغ تكاليفها ؟
- المادة ()
- تكاليفها ()
21- هل تسوق جميع الإنتاج إلى السايلو الحكومي ؟ (اجب بوضع إشارة ✓)
- نعم () - كلا ()
- اذا كان الجواب (كلا) فما هو سبب ذلك ؟
22- كم تبلغ قيمة الطن الواحد من الإنتاج المسوق ؟
- للسايلو الحكومي ()
- للسوق المحلية ()
- هل يوجد وسيط بينك وبين الجهة التي تسق المحصول المنتج ؟ (اجب بوضع إشارة ✓)
- نعم ()
- كلا ()
- اذا كان الجواب (كلا) فكم تبلغ تكاليف النقل لتسويق المحصول المنتج ؟
-
23- هل توجد جمعيات فلاحية تعاونية تعاونيه في منطقتك تذكر ؟
- 24- ما خبرتك الشخصية (عدد السنوات) في زراعة محصول القمح ؟
- () سنوات
- 25- هل تعتقد بان إنتاج القمح في المحافظة يكفي لسد حاجة السكان المحليين ؟
(اجب بوضع إشارة ✓)

وقائع المؤتمر العلمي السنوي الثالث لقسم الجغرافيت / كلية التربية الاساسيت
الجامعة المستنصرية وتحت شعار
(الجغرافيا ودورها في اغناء المعرفة العلمية والتربويت)
24-25 أيار 2021

-
-
- نعم ()
- كلا ()
- 26- ما مقترحاتكم لضمان استدامة الإنتاج في المزرعة ؟ (اجب بوضع إشارة ✓)
- معالجة مشكلة البذور والآفات الزراعية ()
- التأكيد على الالتزام بالحصص المائية المخصصة ضمن الموازنة المائية ()
- إقامة دورات تدريبية للعاملين في الإرشاد الزراعي ()
- ترك طرائق الري التقليدية واعتماد طرائق الري الحديثة ()
- توفير التمويل الكافي والتوسع في القروض الزراعية ()
- دعم سعر المنتج المحلي من قبل الدولة ()
- هل لديك مقترحات أخرى تود إضافتها ؟ (اجب بوضع إشارة ✓)
- نعم ()
- كلا ()
- اذا كان الجواب (نعم) فما هي مقترحاتكم ؟

**Modern irrigation technologies and their role in the agricultural
expansion of wheat crop production
(Holy Karbala Governorate as a model)**

Prof. Dr. Shahla Zakir Tawfiq

Shahla_thakir4@gamil.com

07700123879

A.T. Alaa Abdul-Ilah Faisal

alaa_lover95@yahoo.com

07700600157

Mustansiriyah University-Faculty of Basic Education

Abstract :-

This study is based on the knowledge of the most important modern irrigation technologies used in the cultivation and production of the wheat crop in the holy Karbala governorate and the extent of its role in the agricultural expansion of its production as well as knowing the extent to which it provides the quantities of water used when compared to traditional irrigation methods, through which it may be found that the most important irrigation techniques are The modern used in the production of the wheat crop is (constant and pivotal sprinkler irrigation). The volume of water consumption in the areas used for modern irrigation technologies was less than the volume of water consumption of traditional irrigation methods by (67%). If we used modern irrigation methods instead of traditional irrigation methods in the study area We will be able to provide quantities of water for an area of (9846) dunams, and the reason for this is due to the efficiency of modern irrigation methods through which it is possible to control the amount of added water that is difficult to control when using traditional irrigation methods, in addition to its advantage in the absence of waste. Of water when transported from the source to the field, because it is through pipes, while the water is transported by traditional irrigation methods through the lined or open earthen channels, which because of them in In both cases, the water is exposed to evaporation and exudation, in addition to a quantity of water absorbed from plants and weeds that grow in these channels. As a result of the irrigation efficiency of these modern technologies, this helped expand the area cultivated with wheat in them, while the area cultivated with wheat was estimated at (16370) dunums during the agricultural season (2010-2011), which is the first season for the use of modern irrigation methods (Sprinkler irrigation), it became estimated at (66924) dunums during the agricultural season (2018-2019) and as a result the quantity of production increased significantly, as it reached (68713) tons after it reached (9586) tons during the agricultural season (2010-2011).