تقييم الفعالية ضد بكتيرية والمضادة للأكسدة لمستخلص الفطر *Alternaria chlamydospora* المعزول من التربة

رشيد رحيم حنيت

جامعة ميسان/ كلية العلوم / قسم علوم الحياة

مهدي سيد شخينب

الجامعة التقنية الجنوبية. المعهد التقني في العمارة

الخلاصة

تضمنت الدراسة عزل وتشخيص الفطر *Alternaria chlamydospora* من التربة المحلية وتلقيته وتميئه في وسط Potato Dextrose Agar واستخلص الراشح باستعمال المذيب اثيل استيت (ethyl acetate) للحصول على المستخلص الفطري. وقد اظهر هذا المستخلص فعالية واضحة تجاه كلتا العزلتين القياسيتين (*E.coli* ATCC25922) و *S.aureus* (NCTC6571) والعزلات المرضية *K. pneumonia* , *S.pyogenes* و *Ps.aeruginosa*, باستعمال تقنيه الانتشار بالأقراص وكانت اقطار مناطق التثبيط للمستخلص الفطري 31.5 ملم تجاه *S.aureus* و 29.5 ملم تجاه *E.coli* و 30.0 ملم تجاه *K.pneumoniae* و 17.0 ملم تجاه *S.pyogenes* فيما لم تتأثر العزلة *Ps.aeruginosa*. وكشف اختبار لتركيز المثبط الادنى minimal inhibitory concentration للمستخلص الفطري اقل تركيز مثبط تجاه العزلة *S.aureus* بلغ 3.12 ميكروغرام/مل وكذلك اقل تركيز قاتل minimal bactericidal concentration أيضا تجاه العزلة *S.aureus* اذ بلغ 6.25 ميكروغرام/مل. كما لم يظهر المستخلص الفطري أي سمية تجاه كريات الدم الحمر للإنسان. وظهرت الكشوفات الكيميائية للمستخلص الفطري احتواءه على التانينات والفينولات وعدم احتوائه على احماض امينية وفلافونيدات. وقد اختبرت الفعالية ضد تأكسدية للمستخلص الفطري من خلال قياس قابليتها على اختزال أيونات الحديد الثنائي (Fe II) وقد أظهرت نسب تثبيط عالية. إذ أن الايض المنتج من فطريات التربة يمكن أن يكون مصدرا بديلا للمضادات البكتيرية التجارية .
الكلمات المفتاحية: الفعالية ضد بكتيرية، المستخلص الفطري، البكتريا المرضية ، السمية الخلوية.

المقدمة

تعد الفطريات من أهم الكائنات الحية الدقيقة في إنتاج مركبات الايض الثانوي والتي هي عبارة عن مركبات ناتجة في أوساط زرعية وهي ليست ضرورية لنمو الفطر وإنما كنواتج خارج خلوية وقد تكون لها فوائد أخرى ، وأن نوعية وكمية إنتاج الايض الثانوي يتأثر بعوامل عدة منها نوع الفطر وطبيعة الوسط الغذائي ودرجة الحرارة والحامضية أضافه إلى وجود بعض المحفزات (Demain,1986). يعد العالم (Sachs (1873 أول من عرف الايض الثانوي secondary metabolites والذي أشار إليها كمنتجات طبيعية من الإحياء المجهرية (Berdy ,2005) وما تلاها من أبحاث حول هذا الموضوع في عام 1940 وحتى وقتنا الحاضر فقد عزلت وشخصت العديد من مركبات الايض الثانوي لعدد من الأنواع الفطرية النامية في أوساط زرعيه والتي لها فعالية مثبطة لأحياء مجهرية أخرى لاسيما البكتريا (Forche et al .,1991) ويقدر الان عدد مركبات الايض الثانوي الميكروبية المعروفة إلى مايقارب 50.000 نوع (Berdy , 2005) تنتج الأحياء المجهرية مركبات ايض ثانويه(كالمضادات الحيوية والسموم والقلويدات والستيرويدات وغيرها)خلال مرحلة النمو الطردي للخلية Exponential phase او خلال طور الاستقرار Stationary (phase Mohamed et al ., 2007). ومن المعروف ان الايوض الثانوية تنتجها العديد من النباتات والبكتريا وكذلك الفطريات وتصنف حسب تركيبها الكيميائي وخواصها الفيزيائية إلى Alkaloides, Terpenoide , polyketide Organic acid Phenols, Demain and Fang) وغيرها Steriodes Saponins, Peptides , Ethers , Oils (2000,)وقد عزلت العديد من المضادات الحيوية المثبطة لنمو البكتريا المقاومة *S. aureus* والبكتريا الأخرى مثل المضاد الحيوي Gonomycin المعزول من الفطر *Gonodermaannulane* و Oxalic acid المعزول من الفطر *Lentinusedodes* (Bender et al., 2003). أن المركبات الحيوية المستخلصة من الفطريات تتفاوت في مدى فعاليتها لتثبيط البكتريا وهذا يعتمد على طبيعة المركب الناتج في الوسط الزراعي والظروف التي ينمى فيها الفطر (Anke,1989) وبسبب ازدياد مقاومة سلالات من البكتريا للمضادات الحيوية المستعملة ، فقد توالى الدراسات والأبحاث حول اكتشاف مضاداتعديده بعد اختبار فعاليتها الحيوية وتشخيصها ومعرفة تركيبها الكيميائي . (Stephen and Horace , 2000

المواد وطرائق العمل

عزل الفطريات

جُمعت عينات تربة زراعية من مناطق مختلفة في ميسان شملت خلال عام 2014 وذلك بإزاحة 1 سم من الطبقة السطحية واخذت العينات على عمق 2-5 سم ووضعت في اكياس بلاستيكية نظيفة وجلبت إلى المختبر، استخدمت طريقة التخفيف (Johnson *et al.*, 1959) وذلك بوزن 10 غم من العينة ووضعت في دورق زجاجي يحتوي 100 ملتر من الماء المقطر المعقم ثم رج المزيج جيدا". نقل 1 ملتر من العالق بوساطة ماصة معقمة وأضيفت إلى 9 ملتر من الماء المقطر المعقم للحصول على تخفيف 10^{-2} ، ثم نقل 1 ملتر من هذا التخفيف إلى 9 ملتر من الماء المقطر المعقم للحصول على تخفيف 10^{-3} . ونقل 1 ملتر من هذا التخفيف ووضع في أطباق بتري معقمة وأضيف إليها الوسط الزراعي (Potato Dextrose Agar) الذائب والمعقم وحرك حركة رحوية لتوزيع العينة بشكل متجانس ثم ترك ليتصلب بدرجة حرارة الغرفة ثم حضنت الإطباق في الحاضنة بدرجة حرارة 25 ± 2 م ولمدة 5-7 أيام . استخدمت ثلاث مكررات لكل تركيز. فحصت الإطباق بواسطة مجهر التشريح وأخذت قطعه من النمو الفطري وزرعت على وسط (PDA) للحصول على مزارع نقيه ثم نقلت أجزاء من المستعمرات المعزولة إلى أوساط مائلة slant tubes وحضنت بدرجة حرارة 25 ± 2 م لمدة 5 - 7 أيام ثم حفظت في الثلاجة بدرجة 8 م لحين الاستخدام ، لغرض تصنيف الأنواع المعزولة وتشخيصها نقل جزء من المستعمرات إلى شريحة زجاجية نظيفة حاوية على صبغة Lacto phenol cotton blue وشخصت العزلات الفطرية المنقاة حسب مصادر تصنيفيه (Ellis,1971, 1976;Domsch *et al.*,1980) .

نمو الفطر *A.chlamydospora* على أوساط التخمر

نمي الفطر *A. chlamydospora* على وسط مرق البطاطا الدكستروز Potato dextrose Broth (PDB) كوسط للتخمر وذلك لغرض الحصول على المركبات الأيضية الفعالة إذ لقحت دوارق زجاجية سعة 500 مل حاوية على 300 ملتر من الوسط (PDB) ب5 أقراص مأخوذة بوساطة ثاقب الفلين من مستعمرة الفطر النقية ثم حضنت الدوارق في درجة حرارة 25م لمدة 10 أيام .

استخلاص المواد الفعالة من راشح المزرعة الفطرية

بعد انتهاء فترة الحضان فصل راشح مزرعة الفطر بوساطة الطرد المركزي بمعدل 5000 دورة لمدة 15 دقيقة ثم رشحت باستعمال أوراق ترشيح نوع Whatman No.1 ثم عدل الأس الهيدروجيني للراشح إلى 3 حامض الهيدروكلوريك HCL بتركيز 0.1 عياري ، بعدها استخلصت المواد الفعالة ثلاث مرات من الراشح بإضافة كمية من المذيب العضوي خلات الاثيل Ethyl acetate يعادل حجم الراشح باستعمال قمع الفصل Separating funnel مع الرج لمدة 10 دقائق . جمعت الطبقة العضوية ووضعت في اطباق زجاجية وتركت تتبخر بدرجة حرارة 45م ثم جمعت المستخلصات وحفظت في قناني زجاجيه معقمه ومحكمة الغلق في الثلاجة بدرجة حرارة 8م لحين الاستعمال (Kim et al ,.1999).

السلالات البكتيرية المختبرة

أ: العزلات البكتيرية القياسية

Escherichia coli(ATCC 6572)

Staphylococcus aureus(ATCC 25923)

ب:العزلات البكتيرية المرضية (تم الحصول عليها من م.الصدر التعليمي .ميسان)

Streptococcus pyogenes

Klebsiella pneumoniae

Pseudomonas aeruginosa

اللقاح البكتيري

حضر عالق البكتريا بعد تنميتها على وسط Nutrient Agar لمدة 24 ساعة بنقل عدد من المستعمرات الى 5 ملتر من الماء المقطر وعدل التركيز بحيث يكون 10^6 خلية/مل باستخدام مقياس أنبوية مكفرلاند .

اختبار الفعالية الحيوية للمواد الفعالة المستخلصة من الفطر

أتبعت طريقة الانتشار من الأقراص على الوسط الصلب Disk diffusion method Agar إذ حضرت الاقراص المشبعة بالمادة الخام اعتمادا على طريقة Gould and Bowie(1952) اذ عملت أقراص بقطر 6ملم من ورق الترشيح عددها 100 قرص ثم وضعت في قنينة زجاجية وعقمت بالفرن بدرجة حرارة 150م ولمدة 60 دقيقة ، ثم وزن 3 ملغم من المستخلص الخام للفطر و أذيب في 1ملتر من المذيب العضوي ثنائي مثيل أوكسيد الكبريت Dimethyl sulphoxide(DMSO) (20%) ووضع في القنينة الحاوية

على 100 قرص ثم تركت القنينة مفتوحة في درجة حرارة المختبر ليحفظ المذيب وليصبح تركيز المستخلص المحمل على كل قرص 30 مايكرو غرام / قرص ، ثم خزنت هذه الأقراص في الثلاجة لحين الاستعمال . وضعت الأقراص المشبعة بالمادة الخام على أطباق بتري حاوية على وسط Muller Hinton Agar وملقحة ب 0.1 ملتر من العالق البكتيري لكل سلالة من البكتريا المختبرة والمنشورة بواسطة ناشر زجاجي ، ثم حضنت الأطباق في الحاضنة وتحت درجة حرارة 37م ولمدة 24 ساعة بعدها فحصت الإطباق وقيست الفعالية التثبيطية بقياس قطر منطقة التثبيط حول كل قرص بالمليمتر .

تحديد التركيز المثبط الأدنى والقاتل الأدنى للمواد الفعالة المستخلصة من الفطر

قدر التركيز المثبط الأدنى MIC للسلالات البكتيرية من خلال اجراء تخفيف ثنائي متسلسل للمادة المضادة في أطباق بلاستيكية Microdilution trays حاوية على 96 حفرة Cupped button well بإتباع الطريقة الموصوفة من قبل (Schaudeet al., 1987) . وكما يأتي :

1. نقل 50 مايكروليتر من الماء المقطر المعقم في جميع الحفر باستعمال الماصة الدقيقة.
2. أضيف 50 مايكروليتر من محلول المستخلص الفطري (800 مايكروغرام / مل) في الحفرة الأولى من الصف المناسب في صفيين، وللحصول على 12 تخفيفاً ثنائياً نقل 50 مايكروليتر من حفرة الى أخرى في الصف نفسه .
3. نقل 50 مايكروليتر من المعلق البكتيري 1×10^6 خلية / مل لجميع الحفر ليصبح التركيز النهائي 2×10^5 خلية / مل .
4. اضيف 100 مايكروليتر من وسط MHB المضاعف التركيز للحفر جميعها لتعطي تركيزاً نهائياً للمادة المستخلصة يتراوح بين 0.05 - 100 مايكروغرام/ مل .
5. غطيت الأطباق البلاستيكية ووضعت بدرجة حرارة 37 م ولمدة 1-3 أيام ، حدد التركيز المثبط الأدنى على اساس اخر حفرة خالية من النمو .
6. حدد التركيز القاتل الأدنى MBC لكل مادة على اساس اوطاً تركيز مثبط لا يظهر فيه نمو وحدد من خلال اخذ مسحة من MIC ومن التراكيز التي تليه ونقلت على وسط MHA وحضنت بدرجة 37 م .

اختبار السمية الخلوية للمواد الفعالة المستخلصة من الفطر

استعملت كريات الدم الحمر للإنسان لتحديد السمية الخلوية للمستخلص الفطري وحسب طريقة (Xian- guo and Ursula (1994) . إذ حُضرت التراكيز التالية (400 ، 200 ، 100 ، 50 ، 25) مايكروغرام / مل من مستخلص كل فطر في محلول الفوسفات المنظم الملحي Phosphate buffer saline وأستخدم معامل سيطرة موجب يحتوي على ماء حنفية ومعامل سيطرة سالب يحتوي على phosphate buffer saline فقط . بعدها وضع 0.8 مل من كل تخفيف في أنبوبة اختبار معقمة ، وأضيف لكل أنبوبة 0.2 مللتر من الدم ليصبح الحجم النهائي 1 مللتر لكل أنبوبة . حضنت الأنابيب في الحاضنة بدرجة حرارة 37م لمدة ثلاث ساعات ، فحصت الأنابيب لملاحظة التحلل الدموي Hemolysis وسجلت النتائج .

اختبار الفعالية ضد تأكسدية للمواد الفعالة المستخلصة من الفطر

اختبرت فعالية المادة المستخلصة الخام كمضاد للأكسدة من خلال قياس قابليتها على الاختزال إذ اختبرت قدرة المادة المستخلصة الخام على اختزال أيونات الحديد الثنائي (Fe II) وأجري الاختبار بناء على الطريقة الموصوفة من قبل (Furman(2000 مع إجراء التحويل اللازم والاتي:-

1-تحضير المحلول الخازن Stock solution

حضر محلول الحديد الثنائي بتركيز 100 PPM بوزن (0.0227 غم) من كلوريد الحديدوز ($FeCl_2$) واذيبت في 100 مل من الماء الايوني deionized water باستخدام قنينة دورق حجمي سعة (100 مل) ثم حضرت منة تركيز (1 ppm) في قنينة حجمية سعة 20 مل .

2- حساب الطول الموجي لا أعلى امتصاصية (λ_{max})

أخذ محلول يتكون من الحديد الثنائي بتركيز 1ppm وأضيف إليه 0.1 مل من حامض HCl بتركيز (0.1N) تم المزج في قنينة زجاجية أسطوانية سعة 25 مل مع التحريك المستمر للحصول على محلول متجانس ثم أضيف 3 مل من المحلول المائي للكاشف (phen) 1,10-phenanthroline العديم اللون بتركيز 0.2% فتكون معقد الحديد - الكاشف وهو محلول لونه احمر بعد ذلك رج المحلول بصورة جيدة ليتجانس المحلول ومن ثم قيست الامتصاصية في مدى من الأطوال الموجية مابين (360-630nm) باستخدام جهاز مقياس الطيف الضوئي (spectrophotometer) ومن ثم تم تحديد الطول الموجي

تقييم الفعالية ضد بكتيرية والمضادة للأكسدة لمستخلص الفطر *Alternaria chlamydospora* المعزول من التربة رشيد رحيم حنين ، مهدي سيد شخينج

المقابل لأعلى امتصاصية (λ_{max}) . بعدها تم تحديد فعالية المادة الخام المضادة للتأكسد حيث أضيف (0.5 ، 1 ، 2 ، 3 ، 4، 5) مل الى التركيز 25 ملغ/مل معقد الحديد-الكاشف وتم تحدد امتصاصية المحلول في كل مرة بعد زمن قدرة 15 دقيقة مقابل محلول سيطرة يتكون من معقد الحديد-الكاشف فقط ، اذ ان انخفاض الامتصاصية مع ازدياد حجم محلول المادة الخام يدل على فعالية المادة الخام المضادة للأكسدة.

النتائج والمناقشة

أظهرت النتائج امتلاك المستخلص الفطري فعالية تثبيطية تجاه البكتريا القياسية والمرضية المختبرة باستثناء العزلة *Ps.aeurginosa* بأقطار تثبيط متباينة فقد اظهر المستخلص الفطري اعلى فعالية تثبيطية تجاه العزلة *S.aureus* بقطر تثبيط بلغ 31.5 ملم تلتها العزلة *K.pneumoniae* بقطر تثبيط بلغ 30.0 ملم فيما اظهر اقل فعالية تثبيطية تجاه العزلة *S.pyogenes* (جدول1) .قد يعود هذا التباين في تأثير المستخلص الفطري الى اختلاف المكونات الكيميائية التي يحتويها كالتانينات والتربينات الاحادية والفينولات وغيرها وكذلك امتلاك البكتريا لعدد من اليات المقاومة للمضادات الحيويةفقدره بعض انواع البكتريا على تغير التركيب الكيميائي للمضاد الحيوي بينما تمتلك انواع أخرى القدرة على إعادة إخراج المضاد الحيوي من جسمها او تغير في تركيب مادتها الوراثية من خلال الطفرات ، جميعها عوامل جعلت تصب باتجاه البحث عن انواع جديدة من المضادات الحيوية كما تفاوتت قيم التركيز المثبط الادنى MIC للمادة المستخلصة الخام للفطر *A. chlamydospora* تجاه السلالات البكتيرية القياسية والمرضية(جدول2) ربما يعود ذلك الى الاختلاف في تركيب الجدار الخلوي للبكتريا السالبة والموجبة لصبغة كرام اذ يتصف جدار البكتريا السالبة بقله نفاذية الغلاف الخارجي للمضادات الحيوية بسبب وجود الطبقة الخارجية والتي تحول دون وصول المضادات إلى المنطقة الهدف (Yoshimura and Nikaido , 1982) .وكذلك فأن احتواء جدار البكتريا السالبة لصبغة كرام على مركبات Lipoprotein و Lipopolysaccharides بينما تمتاز جدران البكتريا الموجبة لصبغة كرام بنفاذيتها للمركبات الفعالة ولذلك تكون أكثر تأثرا من البكتريا السالبة لصبغة كرام (Chandrashekhara ,2010) .

جدول(1) معدل أقطار مناطق تثبيط النمو (ملم) للمستخلص الفطري

السلالات البكتيرية	معدل اقطار التثبيط(ملم)
--------------------	-------------------------

تقييم الفعالية ضد بكتيرية والمضادة للأكسدة لمستخلص الفطر *Alternaria chlamydospora* المعزول من التربة رشيد رحيم حنيفة ، مهدي سيد شخينة

29.5	<i>E.coli</i>
31.5	<i>S.aureus</i>
17.0	<i>S.pyogenes</i>
30.0	<i>K.pneumoniae</i>
0	<i>Ps.aeruginosa</i>

شكل (1) الفعالية ضد بكتيرية للمستخلص الفطري

0.25	5.12	<i>S.aureus</i>
50.0	12.5	<i>S.pyogenes</i>
50.0	12.5	<i>K.pneumoniae</i>

وبينت نتائج الدراسة الحالية عدم احتواء المستخلص الفطري الخام للفطر *A. chlamydospora* لأي فعالية سمية تجاه كريات الدم الحمر اذ لوحظ عدم حدوث تحلل في كريات الدم الحمراء خلال فترة الحضان وعند درجة حرارة 37م وهي الظروف التي يجرى عندها الاختبار (Boddington,2009 ;Jain and Pundir,2011)هي ليست ذات

سميه وبالتالي بالإمكان استعمالها كمضادات حيوية لتثبيط نمو البكتريا المرضية إلا أنه يجب تطبيق البروتوكولات الدوائية بهذا الخصوص ومنها إجراء تجارب على الفئران المختبرية بعد أصابتها بالبكتريا المرضية لمعرفة مدى فاعلية هذه المركبات في علاج الفئران المصابة كما أظهرت نتائج الدراسة الحالية بأن للمستخلص الفطري الخام الفطر *A. chlamydospora* فعالية ضد تأكسدية تعمل على اختزال ايونات الحديد الثنائية وتحويلها إلى ذرات الحديد مع وجود فرق معنوي ملحوظ عند مستوى احتمال $p \leq 0.05$ ، كما تبين إن الفعالية ضد تأكسدية للمستخلصات الفطرية الخام تزداد بزيادة حجم المستخلص الفطري الخام فقد أظهر عند الحجم 0.5 ملم اعلي امتصاصية بلغت 0.9 اما عند الحجم 5.0 مل فقد أظهر اقل امتصاصية بلغت 0.1 (شكل 2) اذ كلما قلت نسبة الامتصاصية ارتفعت نسبة الفعالية ضد تأكسدية وقد يعزى سبب الفعالية ضد تأكسدية الى وجود مجموعة (OH) الحرة التي تحويها المستخلصات الفطرية، أن هذا الاختبار مستعمل بكثرة نظرا للخصائص التي يتميز بها منها السهولة والسرعة وانخفاض الكلفة ولقد زاد الاهتمام في الوقت الحاضر بالحصول على مركبات مضادة للتأكسد من مصادر طبيعية ومنها المستخلصات الفطرية (Jayanthia et al., 2011) وهذا يتفق مع دراسة (Murthy et al., 2011) الذي أشار إلى أن المستخلص الميثانولي لانواع من الفطريات التابعة للأجناس *Fusarium* و *Aspergillus* و *Penicillium* و *Mucor* لها فعالية كمركبات مضادة للتأكسد.

References

- Anke, T. (1989). Basidiomycetes: A source for new bioactive metabolites. *Prog. Ind. Microbiol.* 27: 51-66.
- Berdy, J. (2005). Bioactive Microbial Metabolites. *J. Antibiot.* 58: 1-26.
- Bender, S.; Dumitrache, C. N.; Backhaw, T. and Christie, G. (2003). A case for caution in assessing the antibiotic activity of extracts of culinary – medicinal shiitake mushroom (*Lentinusedodes* Berk.) Singer Agaricomycetidae. *Int. J. Med. Mush.* 5:31-35.
- Boddington, M. (2009). Discovery and Evaluation of Novel Antimicrobial Agents against Nosocomial Pathogens. M.Sc. thesis, University of Southern Queensland. pp124.
- Chandrashekhara, S. (2010). Isolation and characterization of antibiotic production from soil isolates by fermentation. Ph.D. thesis, Vinayaka Missions University, India.
- Demain, A.L. (1986). Regulation of secondary metabolism in fungi. *Pure and Appl. Chem.* 58: 219-226.
- Demain, A.L. (2000). Microbial biotechnology. *Trends Biotechnol.* 18:26-31.
- Domsch, K.H.; Gams, W. and Aderson, T. (1980). Compendium of soil Fungi. Academic press, London, Pp.858.
- Ellis, M.B. (1971). Dematiaceous hyphomycetes. *Commonwealth Mycol. Inst. Kew, Surrey, England.*
- Ellis, M.B. (1976). More Dematiaceous hyphomycetes. *Commonwealth Mycol. Inst. Kew, Surrey, England.*

- Mycol. Inst. Kew, surrey, England , 507 pp.
- Forche , E. ; Augustiniak , H. ; Hofle , G. and Reichenbach , H. (1991) .
Ergokonin : Anew antibiotic from *Trichoderma koningii*. *Planta*
Med ., 57 (suppl. Issue-2) pp.A15.
- Furman,N.H.(2000).Standarded methods of chemical analysis , 7th edition .
D.VanNostrad company ,INC. ,New Jersey ,USA .
- Gould , J. C. and Bowie , J. H. (1952) . The determination of bacterial
sensitivity to antibiotics .*Edinburgh Medical J.* 59 -178 .
- Jain, P. and Pundir, R.K.(2011). Effect of fermentation medium, pH and
temperature variations on antibacterial soil fungal metabolite
production . *Journal of Agricultural Technology* 7: 247-269 .
- Jayanthia , G . , Kamalraja,S . , Karthikeyan,K . , and Muthumary, J.
(2011).
Antimicrobial and antioxidant activity of the endophytic fungus
Phomopsis sp. GJJM07 isolated from *Mesuaferrea*. *INT J CURR*
SCI , 1: 85-90 .
- Johnson , L. E. ; Curl , E. A. ; Bond , J. H. and Fribourgh , H.A. (1959) .
Methods for studying soil microflora – plant disease
relationships .Burgess. publ .Co. Minneapolis .USA.
- Kim , H. J. ; Kim ,J. C. ; Kim , B. S. ; Kim , H. G. and Cho , K. Y. (1999)
Antibiotic and phytotoxic activities of *Ophiobol* from *Helmintho*
species . *plantpathol .J.* 15 (1): 14-20.
- Mohamed , A. W. ; Asolkar , R. N. Inderbitzin , P. and Fenical , W. (2007)
Secondary metabolite chemistry of the marine - derived Fungus
Massarina sp., strain CNT016 phytochem . 68 , 1212 - 1218.
- Murthy,N. K. , Pushpalatha , K. C. and Joshi ,C.G.(2011) . Antioxidant
activity and phytochemical analysis of endophytic fungi isolated
from *lobelia nicotianifolia* . *J. Chem. Pharm. Res.*, 3 :218-225
- Stephen, J.C. and Horace, G.C. (2000). Biologically active Natural
Products. CRC press New York, Washington, DC. Pp.277.
- Yoshimura , F. B. and Nikaidio, H. (1982) . Permeability of *Pseudomo-*
nasaeruginosa outer membrane hydrophilic .*J. Bacteriol.* 152
(2): 630-636 .
- Xian-guo, H. Ursula, M. (1994).Antifungal compound from *Solanum ni-*
grescens. *J. Enthopharm.* 43: 173-177.

Evaluation antibacterial activities and antioxidant and antioxidant for fungal extract of *Alternaria* *chlamydospora* isolated from soil

Rashid Rahim Hateet.

Mahdi Sayyid Shkhinab

¹Department of Biology, College of Sciences, University of Missan

² Southern Technical University. Technical institute of Amara

ABSTRACT

The study included isolate and diagnose fungus *Alternaria chlamydospora* of the local soil and purified and development in the PDB medium and the filtrate extracted using a solvent (ethyl acetate) to obtain the fungal extract. This extract has shown bioactivity against both reference isolates (*E.coli* (ATCC25922) and *S.aureus* (NCTC6571)) and pathogenic isolates *S.pyogenes*, *K. pneumonia* and *Ps.aeruginosa* using agar disk diffusion technique, The diameters of the inhibition zones of fungal extract 31.5 mm against *S.aureus* and 29.5 mm against *E.coli*, and 30.0 mm against *K.pneumoniae* and 17.0 mm against *S.pyogenes* While isolation was not affected *Ps.aeruginosa*. The test revealed the minimum inhibitory concentration (MIC) of the fungal extract less inhibitor concentration towards our isolation *S.aureus* was 3.12 µg/ ml also less deadly concentration (MBC). Also against isolate *S.aureus* was 6.25µg/ Ml. also fungal extract showed no toxicity toward human red blood cells. Chemical statements to fungal extract showed a contain on Tannins and phenols, and it contains amino acids and flavonoids. Tested the antioxidant of the fungal extract by measuring its ability to be reduced iron duo ions (Fe II) have shown high rates of inhibition. The metabolic product of soil fungi can be an alternative source of commercial anti-bacterial.

Keywords: Antibacterial activity, fungal extract, pathogenic bacteria, cellular toxicity.